SUPLEMENTOS

2026



NEORNIPHARMA SUPLEMENTOS

PREVENCIÓN A MEDIDA PARA SUS AVES

En este catálogo encontrará una visión general de la gama NeorniPharma destinada a la prevención de enfermedades mediante suplementos naturales altamente concentrados. Esta gama ofrece una alternativa segura y eficaz a los tratamientos medicinales y una solución a largo plazo. Al centrarse en las áreas problemáticas anuales, NeorniPharma pretende crear inmunidad y, por consiguiente, aves más fuertes.

Dirección del mostrador Beverlosesteenweg 129 3583 Paal, Bélgica Número de teléfono +32 (0)11 96 91 02

Dosis adicionales de polvos

Descubra las dosis alternativas en nuestra tabla de dosificación "Polvos y cápsulas" de este catálogo.





Todos los productos NeorniPharma tienen fórmulas únicas y están diseñados por veterinarios basándose en la investigación científica y la experiencia práctica.

Reproducción e inmunid	lad		
PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	INDICACIONES	PRECIO (€
Immuno Booster NEW (1 kg)	20 g/kg de alimento (concentrado)	Premezcla todo incluido	65
Immuno-Plus (100 ml)	2 ml/l	Inmunidad, energía extra, reproducción	25
Immuno-Plus (250 ml)	2 ml/l	Inmunidad, energía extra, reproducción	55
Immuno-Plus (1 l)	2 ml/l	Inmunidad, energía extra, reproducción	179
Immuno Recup Caps (80 c)	1 tapón/0,5-1 kgPC	Inmunidad, recuperación, energía	24
Super Start-Up (200 g)	5 g/kg de alimento	Suplemento inicial para crías, punto negro	25
Vit E + Se (100 ml)	2 ml/l	Extra vitamina E + selenio	17
Vit E + Se (250 ml)	2 ml/l	Extra vitamina E + selenio	35

Hígado, músculos y c	ondición física		
PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	INDICACIONES	PRECIO (€
Hepa-Plus (100 ml)	4 ml/l	Depuración del hígado	20
Hepa-Plus (250 ml)	4 ml/l	Depuración del hígado	36
Hepa-Plus (1 l)	4 ml/l	Depuración del hígado	79
Ready (100 ml)	5 ml/l	Preparación física, forma y flujo sanguíneo	22
Ready (250 ml)	5 ml/l	Preparación física, forma y flujo sanguíneo	48

Megabacterias y disbac	teriosis		
PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	INDICACIONES Salud intestinal, del buche y del proventrículo	PRECIO (€)
Dysbac Liquid (250 ml)	2 ml/l		37

Aceites naturales			
PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	INDICACIONES	PRECIO (€
Feather Energy (400 ml)	5 g/kg de alimento	Aceite de vuelo	19
PikStop (100 ml)	1 ml/l	Picaje	28
Respicor (100 ml)	3 ml/l	Vías respiratorias, estrés térmico	19
Respicor (250 ml)	3 ml/l	Vías respiratorias, estrés térmico	35

Probióticos y desinfec	ción		
PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	INDICACIONES	PRECIO (€)
Neorni Stabilizer (1 l)	5-10 ml/100 ml	Probióticos – entorno	20
Probi-Plus (150 g)	3 g/l	Probióticos y prebióticos	18
SilverSpray (500 ml)	Spray	Spray desinfectante	15
Skin Spray (200 ml)	Spray	Probióticos – infecciones cutáneas	17

Acidificación y desinfección del agua potable

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	INDICACIONES	PRECIO (€)
CU-For Liquid (250 ml)	1-2 ml/l	Acidificación agua potable	15
SilverFlox (1 l)	2 ml/l	Desinfección del agua potable	32
Trichoryza Drops (50 ml)	1 gota/fosa nasal	Jarabe para la garganta	17
Trichoryza Drops (250 ml)	10 ml/kg	Jarabe para la garganta	59
Trichoryza Drops (1 l)	10 ml/kg	Jarabe para la garganta	165

Vitaminas, aminoácidos, electrolitos, minerales y oligoelementos

PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	INDICACIONES	PRECIO (€)
Aminovital (100 ml)	2 ml/l	Aminoácidos, electrolitos y vitaminas	19
Aminovital (250 ml)	2 ml/l	Aminoácidos, electrolitos y vitaminas	35
Aminovital (1 l)	2 ml/l	Aminoácidos, electrolitos y vitaminas	65
Condi-Plus (250 ml)	2 ml/l	Suplemento para la muda	26
Vita Energy (400 g)	10 g/kg de alimento	Polvo reconstituyente - vit., min. y amin.	30
Vita-Min-DCP (100 ml)	2 ml/l	Vitamina D, calcio, fósforo y otros minerale	es 20
Vita-Min-DCP (250 ml)	2 ml/l	Vitamina D, calcio, fósforo y otros minerale	es 35
Vita-Min-DCP (1 l)	2 ml/l	Vitamina D, calcio, fósforo y otros minerale	es 70
Vita-Plus (100 ml)	2 ml/l	Multivitaminas solubles en agua	18
Vita-Plus (250 ml)	2 ml/l	Multivitaminas solubles en agua	28
Vita-Plus (1 l)	2 ml/l	Multivitaminas solubles en agua	65

PURO			
PRODUCTO	DOSIFICACIÓN	INDICACIONES	PRECIO (€)
Levadura de cerveza (1 kg)	15-30 g/kg de ali- mento	Aminoácidos, minerales, oligoelementos, vitamina B	18
Dextrosa (1 kg)	15-30 g/l	Energía, sabor	18
Electrolitos (500 g)	15-30 g/l	Hidratación, estabilización, equilibrio	18
Amarillo (100 g)	1-2 g/kg de alimento	Color	15
Amarillo (500 g)	1-2 g/kg de alimento	Color	60
Proteína de alta digestibilidad (400 g)	5-15 g/kg de aliment	oCrecimiento muscular, aminoácidos/proteí- nas extra	25
Rojo (100 g)	1 g/kg de alimento	Color	28
Rojo (500 g)	1 g/kg de alimento	Color	85





NeorniPharma forma parte de Neorni, un equipo de veterinarios dedicados específicamente a la medicina aviar. Neorni ofrece diversos servicios para garantizar el mejor cuidado de las aves.

> www.neorni.be www.neornilab.be



Consulta veterinaria

NeorniVet Paal NeorniVet Huldenberg



Género • Genes de rendimiento

Parentesco • Autopsia

Pruebas de enfermedades • Bacteriología Determinación de especies • Análisis de

heces • Mutaciones cromáticas



Gama de productos



NeorniVet Huldenberg

Síganos

en Facebook

huldenberg@neornivet.be APERTURA 2026 Neorni (todos los servicios)

Beverlosesteenweg 129 3583 Paal, Bélgica T +32 (0)11 96 91 02

REPRODUCCIÓN E INMUNIDAD



Fomento de la reproducción natural

Reproducción básica

El programa básico de reproducción es la esencia del éxito de la misma. A partir de múltiples pruebas de campo, las aves parecían estar mejor preparadas para la reproducción, lo que se reflejaba en el número de nidos y el número de crías por nido.







Vit E + Se

2 ml/l o 4 ml/kg

Diariamente durante 2-4 semanas antes de la reproducción hasta la primera puesta

Fertilidad +++

Aceite de linaza, arginina, espirulina, carnitina, zinc...

Dosis extraalta de Vit E + Se

Reproducción extra (fertilización)



Los problemas de fertilidad que se producen después de aplicar el programa básico suelen tener una causa nutricional o infecciosa.

- Desde el punto de vista nutricional, un suplemento de Vit E + Se puede ser sin duda de gran utilidad.
- Además, en los últimos años se han aislado algunos gérmenes que influyen notablemente en la fecundación. Puede realizar un cultivo de heces previo a la reproducción fácil y rápidamente en la consulta veterinaria de NeorniVet (± 24h).
- >> Para ciertas situaciones y especies concretas, se puede crear más valor añadido con suplementos específicos como **Vita-Plus**, **Ready**, **Hepa-Plus**...



IMMUNO BOOSTER NEW



Premezcla todo en uno para aves jóvenes



Indicaciones

- Favorece los resultados de la reproducción y mantiene a sus aves en forma
- Aporte de energía adicional
- Ayuda al sistema inmunitario
- Ayuda a desarrollar la flora intestinal gracias a la presencia de probióticos
- Buen desarrollo del esqueleto
- · Ideal para animales que necesitan rendir al máximo

Administración 20 g/kg

- 1 cucharada grande (20 g)/kg de alimento (concentrado) o 2 cucharadas pequeñas (2 g)/100 g de alimento (concentrado)
- Durante la temporada de reproducción: añadir diariamente al alimento (concentrado)
- Energía extra y equilibrar déficits: 1-2 días a la semana durante todo el año

Gluten de maíz, proteína de patata, fermentado de proteína de patata, levadura y sus componentes, fibra de raíz de achicoria, espirulina, levadura, citrato de trimagnesio, mono, di - y triglicéridos de ácidos grasos (c4), citrato tricálcico, L-carnitina, betaína, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, D-pantotenato cálcico, vitamina B6, vitamina B12, vitamina K, niacinamida, ácido fólico, colina, clinoptilolita, cobre, hierro, zinc, manganeso, yoduro potásico, selenio, cobalto, lisina, metionina, glicina, echinaceae purpureae, cúrcuma, lactobacillus acidophilus



Inmunidad, energía extra, reproducción



Indicaciones

- Favorece los resultados de la reproducción y mantiene a sus aves en forma
- · Aporte de energía adicional
- Buen apetito y plumaje
- Utilizar antes/después de un ejercicio o competición intensos
- Favorece el desarrollo y el crecimiento de los animales jóvenes

Administración 2 ml/l agua potable

- Reproducción: diariamente desde 2-6 semanas antes de la reproducción. Dejar de añadir a partir de la primera puesta.
- Exposición/competición: desde 5 días antes de la exposición/competición diariamente 2 ml/l de agua potable o 2 ml/kg de peso corporal directamente en la boca
- Inmunosupresión y enfermedad: 2 ml/l de agua potable durante 14 días o 2 ml/kg de peso corporal directamente en la boca hasta que se recupere
- Infecciones virales (circovirus, bornavirus, etc.): durante 4-8 semanas para refuerzo y fortalecimiento de la inmunidad

8

IMMUNO RECUP CAPS



Inmunidad, recuperación, energía



Indicaciones

- Favorece la recuperación tras una enfermedad o esfuerzo
- Aporte de energía adicional
- Ayuda al sistema inmunitario
- Perfecto para un rendimiento máximo

Administración

- Recuperación o refuerzo inmunitario: 1 cápsula/0,5-1 kg por vía oral durante 5-10 días
- Energía adicional: 1 cápsula/0,5-1kg por vía oral
- Paloma: día de la vuelta a casa, 1 cápsula/paloma
- Refuerzo a la reproducción: durante los 14 días anteriores al apareamiento hasta la puesta: 1 cápsula/0,5-1 kg
- Immuno Recup Caps puede administrarse directamente o a través de los alimentos. Cuando se administra a través de la comida, debe consumirse la dosis completa.

Gluten de maíz, proteína de patata, fermento proteico de patata, levadura y sus componentes correspondientes, fibra de raíz de achicoria, espirulina, levadura, citrato de trimagnesio, mono-, di- y triglicéridos de ácidos grasos (c4), citrato tricálcico, L-carnitina, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, D-pantotenato de calcio, vitamina B6, vitamina B12, vitamina K, niacinamida, ácido fólico, colina, clinoptilolita, cobre, hierro, zinc, manganeso, yoduro de potasio, selenio, cobalto, lisina, metionina, glicina, echinacea purpureae, cúrcuma, lactobacillus acidophilus

SUPER START-UP



Iniciación de las crías, punto negro



Indicaciones

- Iniciación fluida de sus crías en las primeras 6 semanas de vida
- Supresión natural de la enteritis/diarrea bacteriana y necrótica
- Crecimiento rápido y aves más grandes, a través de una iniciación fluida y la supresión natural del punto negro

Administración 5 g/kg alimento (concentrado)

 Diariamente desde la primera puesta hasta que se aparta a las crías



Extra vitamina E + selenio



100 ml **17 €** 250 ml **35 €**

> + espirulina + zinc + aceite de

Indicaciones

- Para animales con carencia de vitamina E y selenio
- ORIENTATIVO para los síntomas nerviosos

Administración

- 2 ml/l de agua potable o 1 ml/kg de peso corporal directamente en el pico
- Recomendación en caso de síntomas nerviosos: durante 7-10 días



-Fertilidad +++

Diariamente 2 ml/l o 4 ml/kg de alimento durante 2-4 semanas, antes de la reproducción hasta la primera puesta


11




Tratamiento de fertilidad

Tratamiento individual (machos ♂ y hembras ♀)





INICIACIÓN TRAS EL APAREAMIENTO



HÍGADO, MÚSCULOS Y CONDICIÓN FÍSICA





Depuración del hígado





14

Indicaciones

- · Contribuye al buen funcionamiento del hígado
- Para depurar el hígado

Administración

- Curativo: 4 ml/l de agua potable durante 5-14 días
- Preventivo: 2 ml/l de agua potable, 2-3 días a la semana



Puede administrarse diariamente para proteger el hígado durante la administración de medicamentos o colorantes



Preparación física, forma y flujo sanguíneo



Indicaciones

- Aumento de la forma: para mejorar el rendimiento del vuelo
- Estimula el metabolismo de las grasas y la capacidad de resistencia
- Favorece el flujo sanguíneo


Administración 5 ml/l agua potable

- Aumento de la forma:
 - Antes de la temporada de exhibición/vuelo: durante 2 semanas
 - Antes de vuelos importantes: durante 2-5 días
- **Aves obesas:** durante 3-5 días a la semana hasta alcanzar el objetivo
- Anemia: 7-10 días
- Dosis ajustada aves canoras < 250 g de peso corporal (canario, lúgano ...): 1-2 ml/l

15

Notas

• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •
• • •	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •		• • •	• • •
• • •			• •	• • •		• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •		• •	• • •	• •	• • •		• • •	• •		• •		• •	• • •	• • •			• • •	• • •	• • •		• • •	• • •
			•			•			• •					• •																				
• • •	• • •	• • •	•••	• •	• • •	•••	• • •	• • •	•••	• • •	• • •	•••	• • •	• • •	•••	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	•••	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •
• • •	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	•••	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •
• • •	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •
• • •	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •
• • •	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •		• • •	• •
															• •						•													
• • •	• • •	• • •	•••	• •	• • •	•••	• •	• • •	•••	• • •	• • •	•••	• • •	• • •	•••	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	•••	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	•••	• • •	•••	• • •	• • •
• • •	• • •	• • •	•••	• •	• • •	•••	• •	• • •	•••	• • •	• • •	•••	• • •	• • •	•••	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	•••	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •
• • •	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• •	• • •	•••	• • •	• • •	•••	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •
• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	•••	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	••	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •
• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	••	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •
• • •	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	••	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •



MEGABACTERIAS Y DISBACTERIOSIS





Dysbac Liquid es una versión mejorada y ampliada de CU-For Liquid que se centra más en la salud intestinal y la inmunidad general.



SALUD DEL BUCHE, DEL **PROVENTRÍCULO Y DE LOS** INTESTINOS, PREVENCIÓN **DE LA DISBACTERIOSIS**

- >> Ácidos grasos de cadena corta: Ácido fórmico, ácido propiónico, ácido cítrico
- >> Ácidos grasos de cadena media: ácido butírico, mono-, di- y triglicéridos de ácidos grasos (C8-C10)
- >> Sustancias aromáticas: orégano, equináceas purpúreas, jengibre, canela, pimienta negra, ajo y boswellia
- ▶> Vitamina C
- >> Quelato de cobre y de zinc
- >> Fibra extra
- >> Aceite de pescado



OBJETIVO



ayudarle

ACIDIFICACIÓN DEL AGUA, CALIDAD DEL AGUA

1-2 ml/l

+++

++

>> Ácidos grasos de cadena corta: formiato de amonio, ácido acético, ácido láctico, ácido fórmico, ácido propiónico

>> Sulfato de cobre y de zinc





Salud del buche, proventrículo e intestinos



Indicaciones

- Forma una película protectora en la mucosa intestinal
- · Aumenta las defensas del organismo
- Ayuda a mantener el equilibrio natural de la flora intestinal
- Para utilizar en caso de heces líquidas

Administración 2 ml/l agua potable

- Preventivo: 1 o 2 días/semana
- En caso de problemas digestivos: durante 7-14 días



-Prevención de la megabacteriosis y la disbacteriosis

- 1-2 días a la semana 2 ml/l de agua potable
- Puede combinarse con ACS

19

Trichoryza Drops

Una solución contra los tricomonas sin pérdida de forma



¡Eficacia comprobada contra tricomonas resistentes!





ACEITES NATURALES



FEATHER ENERGY



Aceite para el vuelo, fuente de energía

de sustancias grasas





22

Indicaciones

- Fuente de energía de sustancias grasas
- Calidad de la pluma, emplume óptimo
- Extra de vitaminas A, D y E
- Alta fuente de ácidos grasos omega 3-6-9

Administración 5 ml/kg de alimento

- Muda: 2 días/semana
- Reproducción: 2-3 días/semana
- Temporada de vuelo:
 - Salida: durante 2-5 días antes del enceste en combinación con Vita Energy
 - Regreso: durante 2 días en combinación con Inmuno Rooster NFW



Puede utilizarse para mejorar la absorción de Immuno Booster NEW y Vita Energy junto al

Aceites prensados en frío: aceite de linaza, aceite de hígado de bacalao, aceite de colza, aceite de salmón, lecitina, aceite de germen de maíz, aceite de germen de trigo, aceite de girasol, aceite de semillas de cáñamo (incluidas las vitaminas A, D y E)

Notas

• •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• • •	• •	• •	•	• •	• •	• •	• •	• •	•	• •	•	•	• •	•	•	•	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	• •	• •	•	• •	• •	•
• •	• • •	• •	• •	• • •	• •					• •					•		•			•					•					•		•		•		•		•	• •			•			•	• •	•			•			
• •	• • •		• •	• • •	• •		• •			• •					•		•			•					•					•		•				•			• •						•	• •				•			
••				• • •	• • •					••					•		•						•		•					•		•				•			••						•	• •				•	• •		
••	• • •		• •	• • •	• •					• •					•		•			•					•					•		•				•			• •						•	• •				•			
	• • •			• • •						••					•		•						•							•		•				•		•							•					•			
••				• • •	• •					••					•		•													•		•				•			• •						•					•			
				• • •						••					•		•															•				•									•					•			
••				• •	• • •	• • •		• • •																																										• •			
						• • •																									•						•		•											• •			
••						• • •																																												• •			
						• • •																																															
						• • •																																												• •			
						• • •																																															
						• • •																																															
						• • •																																															
						• • •																																															
						• • •																																															
•••																																																			••		•
••	•••	••	•	• • •	• •	•	• •	• •	•	••	••	• •	•	•••	•	•	•	•	••	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
• •		• •	• •	• • •	• •	• • •	• •	• •	•	• •	• •	• •	• •	• •	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	•	• •	٠	• •	•	• •	•	• •	• •	•	• •	•	•	• •	•	•	• •	•

PIKSTOP



Picaje, agitación





24

Indicaciones

• Picaje en aves y aves de corral

Administración

• 1 ml/l de agua potable durante 4-6 semanas



Arrancado de plumas/picaje

Adminístrese simultáneamente con *Immuno-Plus* para obtener resultados óptimos



Vías aéreas, estrés térmico



Indicaciones

- Solución natural para los problemas respiratorios
- Supresión del dolor/inflamación en problemas respiratorios
- Mucosidad espesa
- Estrés térmico

Administración

3 ml/l de agua potable o 0,5 ml/kg de peso corporal directamente en el pico

- Preventivo: al comprar animales nuevos, durante 10-14 días
- Curativo: en caso de problemas de las vías respiratorias leves o moderados, durante 10-14 días
- Estrés térmico: 3-5 ml/l



Refuerzo adicional para palomas de competición con altas temperaturas 3 ml/l de agua, en combinación con *Aminovital*, el día del enceste


2026

neofalco

productos para aves rapaces



más información: info@neornipharma.be



PROBIÓTICOS Y DESINFECCIÓN



NEORNI STABILIZER



Spray ambiental probiótico





28

Indicaciones

- Reducción de la concentración patógena en el entorno de sus aves
- Forma un entorno estable y saludable al llenarlo de bacterias probióticas seguras

Administración

- Dilución que utilizar: 5-10 % (5-10 ml/100 ml) en agua templada
- Pulverizar completamente el área que estabilizar
- Pulverizar diariamente en el corral durante la primera semana (puede pulverizar en presencia de las aves, incluso de los polluelos)
- Después, pulverizar dos veces por semana para mantener la protección probiótica
- El producto diluido en agua puede conservarse hasta un máximo de 5 días



Puede nebulizarse en presencia de las aves/ palomas, especialmente durante periodos importantes o estresantes en los que aumenta la presión bacteriana ambiental

Notas

• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •
• • •	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •		• • •	• • •
• • •			• •	• • •		• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •		• •	• • •	• •	• • •		• • •	• •		• •	• • •	• •	• • •	• • •			• • •	• • •	• • •		• • •	• • •
			•			•			• •					• •																				
• • •	• • •	• • •	•••	• •	• • •	•••	• • •	• • •	•••	• • •	• • •	•••	• • •	• • •	•••	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	•••	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •
• • •	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	•••	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •
• • •	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •
• • •	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •
• • •	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •		• • •	• •
															• •						•													
• • •	• • •	• • •	•••	• •	• • •	•••	• •	• • •	•••	• • •	• • •	•••	• • •	• • •	•••	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	•••	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	•••	• • •	•••	•••	• • •
• • •	• • •	• • •	•••	• •	• • •	•••	• •	• • •	•••	• • •	• • •	•••	• • •	• • •	•••	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	•••	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •
• • •	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	•••	• • •	• • •	•••	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •
• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	•••	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	••	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •
• • •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	••	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •
• • •	• • •	• • •	• •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• •	• • •	••	• • •	• •	• • •	• • •	• •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •



Probióticos y prebióticos





30

2/1

Indicaciones

- Aumenta el cultivo benigno y la flora intestinal
- Asegura una mejor digestión e instaura la flora intestinal y del buche en las aves jóvenes
- Después del tratamiento antibiótico

Administración 3 g/l de agua potable o 6 g/kg de alimento

- Preventivo: 2 días a la semana
- Heces líquidas o después de un tratamiento antibiótico:
 5-7 días
- Cambiar el agua diariamente
- Puede combinarse con otros suplementos (vitaminas)



Cambiar el agua 2 veces al día o administrar a través del alimento



Spray desinfectante





Indicaciones

- · Desinfectante de amplio espectro
- · Bactericida, fungicida, virucida

Administración

- Nuevo spray desinfectante listo para usar
- Adecuado para corrales, jaulas, material y huevos
- Indicado para la limpieza del plumaje sucio (excremento, sangre...)



Seguro para aplicar en presencia de sus pájaros

31

SKIN SPRAY



Aerosol probiótico para infecciones cutáneas





32

Indicaciones

- Adecuado para aves con piel sensible
- Para el cuidado externo de la piel
- Reduce la formación de caspa

Administración

• Pulverizar el área que estabilizar



Tiña de la cresta, cresta blanca, tiña favosa

Pulverizar diariamente la cresta o la zona infectada. No es perjudicial para los ojos ni las vías respiratorias.



ACIDIFICACIÓN Y DESINFECCIÓN DEL AGUA POTABLE





Acidificación del agua potable





34

Indicaciones

· Acidificación del agua potable, disminución del pH

Administración 1-2 ml/l agua potable

Preventivo: 1 o 2 días/semana



Fórmula excepcionalmente concentrada, muy rentable



Desinfección del agua





Indicaciones

- · Desinfección del agua
- Prevención de bacterias nocivas, virus, levaduras y mohos
- · Refuerzo del sistema inmunitario

Administración

• 2 ml/l de agua potable



Mayor duración y mejor acción gracias a la incorporación de plata

35

TRICHORYZA DROPS



Jarabe para la garganta





36

Indicaciones


- · Tratamiento preventivo de las tricomonas
- Refuerza la salud de la garganta y del buche
- Efecto beneficioso en las vías respiratorias superiores
- Ayuda a prevenir enfermedades

Administración

- El día después de la llegada a casa:
 - Administración recomendada: 10 ml/kg de alimento
 Preparar siempre de nuevo antes de cada toma.
 Efecto óptimo hasta 2 horas después de la mezcla.
 - 5 ml/l de agua
 - 1 gota por fosa nasal
- Preventivo: 1 día a la semana
- En casos graves: 2 días/semana
- Precaución: deja manchas en ropa y manos



Eficacia comprobada en casos de tricomonas resistentes: durante 5 días 20 ml/kg de alimento



VITAMINAS, AMINOÁCIDOS, ELECTROLITOS, MINERALES Y OLIGOELEMENTOS



AMINOVITAL



Aminoácidos, electrolitos y vitaminas



38

Indicaciones

- Todos los aminoácidos esenciales para una buena muda, desarrollo de las plumas y formación de pigmentos
- Favorece la recuperación
- Desarrollo y recuperación muscular

Administración 2 ml/l agua potable

- Palomas deportivas: 5 ml/l durante la temporada de vuelo
- Durante todo el año: 1 o 2 días/semana
- Durante todo el periodo de muda: 3 días/semana.
 Puede combinarse con Condi-Plus.



Refuerzo adicional para palomas de competición con altas temperaturas 5 ml/l de agua, en combinación con *Respicor*, el día del enceste

Dextrosa, glicerol, cloruro sódico, fibra prebiótica, citrato trimagnésico, zumo de remolacha, cloruro potásico, sacarosa, cloruro cálcico, citrato tricálcico, lisina, metionina, treonina, triptófano, histidina, carnitina, betaína, colina, vitamina B1, vitamina B2, niacinamida, D-pantotenato cálcico, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, biotina, vitamina C, vitamina E, selenio, cobre, zinc, manganeso, mezcla de componentes aromáticos naturales, L-isoleucina, L-valina, L-leucina



Suplemento para la muda



Indicaciones

- · Refuerza la condición física durante la muda
- Mejora el metabolismo
- Aporte de energía adicional
- Estimula el apetito

Administración 2 ml/l agua potable

• Durante todo el periodo de muda: 3 días/semana. Puede combinarse con *Aminovital*.

39

VITA ENERGY

400 g 30 €

Polvo para condición física - Vitaminas, minerales y aminoácidos



40

Indicaciones

- Mejora la condición física y aporta un extra de energía
- Vitaminas, minerales y aminoácidos adicionales
- Aumenta la capacidad de resistencia
- Estimulación de la reproducción

Administración

- Administración recomendada: 10 g/kg de alimento
- A través del agua: 4 g/l





- General: Durante todo el año: 1-2 días/semana. En caso de mal estado/deterioro de la condición física, durante 14 días.
- Estimulación de la reproducción: 2-4 semanas antes de la reproducción, 2 días/semana a diario
- Paloma: Medio fondo/fondo: 2-5 días antes del encestado

Dextrosa, maltodextrina, concentrado de proteína de soja, carbonato cálcico, levaduras y sus partes, citrato trimagnésico, fosfato monosódico, bicarbonato sódico, cloruro sódico, cloruro potásico, fosfato trisódico, citrato tricálcico, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B11, vitamina B12, biotina, vitamina C, cloruro de colina, hierro, cobre, zinc, manganeso, yoduro de potasio, selenio, lisina, metionina, triptófano, treonina, mezcla de componentes aromáticos naturales



Solución líquida de vitamina D, calcio,

fósforo y otros minerales



100 ml **20 €** 250 ml **35 €** 1 | 70 €

Extra de calcio

Indicaciones

- Para animales con carencia de vitamina D3, calcio, fósforo y otros minerales
- Favorece el desarrollo y la formación de huesos en los animales jóvenes
- Favorece la producción de la cáscara de huevo
- Mala calidad de la cáscara de huevo/huevos sin cáscara

Administración 2 ml/l agua

- Preventivo: 2 ml/l
 - 2 semanas antes de la reproducción hasta la puesta de los huevos: 2-3 días/semana
 - Durante las 6 primeras semanas de vida: 2-3 días/ semana
- Curativo: 5 ml/l durante 14 días
- Apoyo en caso de fracturas: durante 6 semanas 5 ml/l de agua potable o 0,5 ml/kg de peso corporal directamente en el pico



Cambiar el agua 2 veces al día o administrar a través del alimento - preventivo: 4 ml/kg de alimento (concentrado) - curativo: 10 g/kg de alimento (concentrado)

41



Multivitaminas solubles en agua





42

Indicaciones

- Suplemento con todas las vitaminas esenciales
- Salud diaria general
- Prevención de la carencia crónica de vitamina A

Administración 2 ml/l agua potable

- Semanalmente: 1-2 días a la semana
- Después de enfermedad/recuperación: 3-5 días consecutivos



En loros y cotorras, recomendamos encarecidamente administrar *Vita-Plus* a través del agua 1-2 días a la semana para prevenir la carencia de vitamina A.



La alta concentración de vitamina K ayuda a prevenir o reparar las hemorragias

PURO PURO



LEVADURA DE CERVEZA



Indicaciones

- Aminoácidos, minerales y oligoelementos
 - Vitamina B

Administración 15-30 g/kg de alimento

1 kg **18 €**

DEXTROSA



Indicaciones

- Aporte extra de energía
- · Agua medicinal aromatizada

Administración 15-30 g/l agua

1 kg **18 €**

ELECTROLITOS



Indicaciones

- En caso de deshidratación
- Estabilización del equilibrio hídrico y electrolítico

Administración 15-30 g/l agua

500 g **18 €**

44 AMARILLO



Indicaciones

Color

Administración 1-2 g/kg de alimento

100 g **15 €** 500 g **60 €**

PROTEÍNA DE ALTA DIGESTIBILIDAD



Indicaciones

- Crecimiento muscular
- Aporte extra de aminoácidos y proteínas

Administración 5-15 g/kg de alimento

400 g **25 €**

ROJO



Indicaciones

Color

Administración 1 g/kg de alimento

100 g **28 €** 500 g **85 €**



PROGRAMAS DE AVES CANORAS






46



Programa anual Euro y Canarios

Cronología



Preparación de la reproducción

- Estimulación de reproducción
- Depuración del hígado
 Prevención del punto negro

Polluelos destetados

Primera puesta hasta el destete

Inicio óptimo y prevención de la

colibacilosis

Supresión de coccidiosis/atoxoplasmosis,

bacterias, virus, levaduras y hongos

- Prevención de coccidiosis/ atoxoplasmosis, megabacteriosis y disbacteriosis
- Limitación de la presión con aumento de la inmunidad

Programa anual Euro y Canarios

El calendario anual es una guía general a través de la preparación, la reproducción, la eclosión, el destete y la muda. Consulte con su veterinario las necesidades específicas de sus aves y elaboren juntos un programa personalizado.

Preparación desde la semana 6-8 antes de reproducción

- 1. ¡Todo comienza con un entorno saludable! (ver Virkon™S o SilverSpray)
- 2. Prevención de atoxoplasmosis/coccidiosis + megabacteriosis/disbacteriosis
- Veterinario: revisión de las aves + análisis de heces 6-8 semanas antes de la reproducción
- Solo recurrir a tratamiento en caso de problemas:
 - 5 días Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 3 días Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 5 días Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
- 3. Durante 6 semanas antes de la reproducción
- · Immuno-Plus (2 ml/l) cada día
 - Estimulación de la reproducción: las aves alcanzan la mejor condición (de reproducción)
- 1-2 días a la semana Hepa-Plus (4 ml/l)
 - Depuración del hígado
- Según se necesite: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP
 - Todos ellos pueden combinarse con Immuno-Plus
- Extra: prevención punto negro
 - Durante 7 días Gould Mix (5 g/l)durante la preparación de la reproducción
- 4. Prevención de ectoparásitos
- Ácaros rojos
 - Exzolt: 1 ml/l durante 1 día, repetir al día 7 y 14
 - No influye en la fertilidad ni en los polluelos
 - Puede repetirse cada 3 meses
 - Prevención complementaria de los ácaros de aves
 - Antes de comenzar, trata el corral o pajarera con:
 - Derma-Plus
- Ácaros de las plumas
 - Vermi-Complete (1 ml/l de agua de baño)

Reproducción: Primera puesta hasta el destete de las crías

- 1. Inmuno Booster NEW (2 g/100 g o 20 g/kg alimento (concentrado)
- Premezcla todo en uno para aves jóvenes
- 2. Primeras 6 semanas
- Opción 1: Super Start-Up (5 g/kg alimento (concentrado))
 - Supresión natural y prevención de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos
- Opción 2: Super Start-Up Blue (20 g/kg alimento (concentrado)
 - Supresión de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos



- 3. Desde 2 días antes de la eclosión hasta 5 días después de la eclosión **Coli-mix (5g/l)**
- Prevención de la colibacilosis
- Alternativa a Coli-Mix: Gould Mix (5 g/l)

Reproducción: jóvenes destetados

- 1. ¡Todo comienza con un entorno saludable!
- Virkon™S o SilverSpray
 - Entorno libre de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y mohos
- **Neorni Stabilizer:** Spray ambiental probiótico
 - Prevención mediante la reducción de la presencia bacteriana
- 2. Tratamiento preventivo
- Tercera semana después del destete
 - Mayor susceptibilidad a la atoxoplasmosis/megabacteriosis
 - 5 días Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 3 días Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 5 días Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
- 3. Después, durante todo el año (desde el destete hasta el periodo de reproducción)
 - 3-5 días ACS (0,5 ml/l) 1-2 veces/mes
 - ¡Prevención de la coccidiosis con refuerzo de la inmunidad!
 - 1-2 días a la semana Dysbac Liquid (2 ml/l)
 - Prevención de la megabacteriosis y la disbacteriosis

Periodo de muda

Durante toda la duración de la muda Condi-Plus + Aminovital:

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 días/semana
- Aminovital (2 ml/l): 3 días/semana
- Pueden administrarse simultáneamente

Temporada intermedia

Durante todo el año (desde el destete hasta el periodo de reproducción)

- 3-5 días ACS (0,5 ml/l) 1-2 veces/mes
 - ¡Prevención de la coccidiosis con refuerzo de la inmunidad!
- 1-2 días a la semana Dysbac Liquid (2 ml/l)
 - Prevención de la megabacteriosis y la disbacteriosis
- Según se necesite: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP

En NeorniPharma, siempre buscamos la mejor solución a largo plazo. Buscamos constantemente **alternativas** a los antimicrobianos para reducir el riesgo de resistencia. El objetivo debería ser tratar a nuestras aves lo menos posible de forma preventiva con anti-microbianos. Para ello, la investigación clínica y posiblemente las pruebas adicionales son cruciales. Una vez que se ha hecho un diagnóstico correcto, se puede iniciar un tratamiento adecuado. Los antibióticos no son inocuos. Consulte a su veterinario para un uso correcto y responsable. **Autopsias:** ¡no tire las aves muertas sin más! Una autopsia puede proporcionar mucha información para llegar a un tratamiento adecuado. Lo mejor es mantener las aves en frío (nevera) y examinarlas en un plazo de 24 horas (máx. 72 horas).

Preparación de la reproducción



Desde 6 semanas antes de la reproducción hasta la primera puesta



Immuno-Plus

Estimulación de la producción de espermatozoides y óvulos

Hepa-Plus

4 ml/l

6 semanas antes del apareamiento de la primera puesta

1-2 días/semana

Refuerza el hígado



Refuerzo extra

Vit E + Se

2-4 semanas antes del apa-reamiento hasta la primera puesta

Dosis extra elevada de Vit E+

Vita-Min-DCP

2 ml/l

2 semanas antes del apareamiento hasta la primera puesta

2 días/semana

Extra de calcio, fósforo, vitamina D3 y oligoelementos

Ready

Vita-Plus/Vita Energy

2 ml/l o 10 g/kg

A: Durante todo el año: B: 2 semanas antes del apareamiento de la primera puesta

A: 1-2 días/semana B: A diario

Suplemento vitamínico

FECUNDACIÓN

CÁSCARA DE HUEVO CONDICIÓN FÍSICA

VITAMINAS



Reproducción: desde la eclosión hasta el destete



50

Coli-Mix



5 g/l o 10 g/kg de alimento (concentrado)

De 2 días antes a 5 días después de la eclosión

Ninguna influencia en la fertilidad

Mezcla de amplio espectro

Prevención de la colibacilosis y de la cochlosomiasis

Immuno Booster NEW

20 g/kg de alimento (concentrado)

Diariamente desde la primera puesta hasta el destete de las crías

Influencia positiva en la fertilidad

Premezcla todo incluido

Mantenimiento de la producción de óvulos y espermatozoides

Super Start-Up

5 g/kg de alimento (concentrado)

Supresión natural y prevención de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras v hongos

Super Start-Up Blue

20 g/kg de alimento (concentrado)



Supresión de coccidiosis/ atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos


Immuno Booster NEWContiene todos los componentes esenciales para la crianza de aves jóvenes. Es una premezcla única todo en uno para mezclar con el alimento (concentrado) que contiene todos los nutrientes necesarios en concentraciones especialmente elevadas.

Immuno Booster NEW: Polipéptidos Mantiene las aves en forma durante la reproducción. Levadura de cerveza Fuente de proteínas, aminoácidos y nucleótidos. Fibras de raíz de achicoria Fibra prebiótica: digestión equilibrada. Espirulina Fuente de proteínas, grasas, hidratos de carbono, vitaminas y minerales. Electrolitos Equilibrio hídrico. Ácidos grasos Energía, digestión equilibrada. Todas las vitaminas hidrosolubles y liposolubles Inmunidad general, antioxidantes, crecimiento, liberación de energía. Todos los aminoácidos Desarrollo de la musculatura y del plumaje. L-carnitina Favorece la digestión de las grasas y el desarrollo muscular. Colina Refuerzo del hígado. Minerales (cobalto, hierro, cobre, zinc, manganeso, yodo, selenio) Inmunidad general, antioxidantes, crecimiento, liberación de energía. Clinoptilolita Salud general e intestinal. Probióticos Estabilizador de la flora intestinal. Cúrcuma y equinácea Inmunidad general y salud.





Reproducción: jóvenes destetados







Programa anual exóticos

El calendario anual es una guía general a través de la preparación, la reproducción, la eclosión, el destete y la muda. Consulte con su veterinario las necesidades específicas de sus aves y elaboren juntos un programa personalizado.

Preparación desde la semana 6-8 antes de reproducción

- 1. ¡Todo comienza con un entorno saludable! (ver Virkon™S0 o SilverSpray)
- 2. Prevención de flagelados (cochlosoma) + campylobacter
- Veterinario: revisión de las aves + análisis de heces 6-8 semanas antes de la reproducción
- Solo recurrir a tratamiento en caso de problemas:
 - Durante 7 días Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
- 3. Durante 6 semanas antes de la reproducción
- Immuno-Plus (2 ml/l) cada día
 - Estimulación de la reproducción: las aves alcanzan la mejor condición (de reproducción)
- 1-2 días a la semana Hepa-Plus (4 ml/l)
 - Depuración del hígado
- Según se necesite: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP
 - Todos ellos pueden combinarse con Immuno-Plus
- Prevención de la cochlosomiasis y la campilobacteriosis
 - Durante 7 días **Gould Mix (5 g/l)**durante la preparación de la reproducción
- 4. Prevención de ectoparásitos
- Ácaros rojos
 - Exzolt: 1 ml/l durante 1 día, repetir al día 7 y 14
 - No influye en la fertilidad ni en los polluelos
 - Puede repetirse cada 3 meses
 - Prevención complementaria de los ácaros de aves
 - El día anterior al uso, tratar el corral o la pajarera con:
 - Derma-Plus
- Ácaro respiratorio
 - **Vermi-Complete:** 2,5 a 5 ml/l durante 1 día, repetir al cabo de 3 semanas
- Ácaros de las plumas
 - Vermi-Complete (1 ml/l de agua de baño)

Reproducción: Primera puesta hasta el destete de las crías

- 1. Inmuno Booster NEW (2 g/100 g o 20 g/kg alimento (concentrado)
- Premezcla todo en uno para aves jóvenes
- 2. Primeras 6 semanas
- Opción 1: Super Start-Up (5 g/kg alimento (concentrado))
 - Supresión natural y prevención de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos
- Opción 2: Super Start-Up Blue (20 g/kg alimento (concentrado)
 - Supresión de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y hongos
- 3. Desde 2 días antes de la eclosión hasta 5 días después de la eclosión Coli-mix (5 g/l)
- Prevención de la colibacilosis
- Alternativa a Coli-Mix: Gould Mix (5 g/l)



- 4. Para problemas en las primeras 6-8 semanas de vida
 - Gould Mix (5 g/l)
 - Para el tratamiento de la cochlosomiasis, las levaduras y la diarrea bacteriana

Reproducción: jóvenes destetados

- 1. ¡Todo comienza con un entorno saludable!
- Virkon™S o SilverSpray
 - Entorno libre de coccidiosis/atoxoplasmosis, bacterias, virus, levaduras y mobos
- Neorni Stabilizer: Spray ambiental probiótico
 - Prevención mediante la reducción de la presencia bacteriana
- 2. Tratamiento preventivo
- Tercera semana después del destete
 - Mayor susceptibilidad a la coccidiosis, cochlosomiasis o campylobacter
 - 5 días Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
 - 3 días Hepa-Plus (4 ml/l)
 - 5 días Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
- 3. Después, durante todo el año (desde el destete hasta el periodo de reproducción)
 - 3-5 días ACS (0,5 ml/l) 1-2 veces/mes
 - :Prevención de la coccidiosis con refuerzo de la inmunidad!
 - 1-2 días a la semana Dysbac Liquid (2 ml/l)
 - Prevención de la megabacteriosis y la disbacteriosis
 - Prevención de flagelados (cochlosomiasis)

Periodo de muda

Durante toda la duración de la muda Condi-Plus + Aminovital:

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 días/semana
- Aminovital (2 ml/l): 3 días/semana
- Pueden administrarse simultáneamente

Temporada intermedia

Durante todo el año (desde el destete hasta el periodo de reproducción)

- 3-5 días ACS (0,5 ml/l) 1-2 veces/mes
 - ¡Prevención de la coccidiosis con refuerzo de la inmunidad!
- 1-2 días a la semana Dysbac Liquid (2 ml/l)
 - Prevención de la megabacteriosis y la disbacteriosis
 - Prevención de flagelados (cochlosomiasis)
- Según se necesite: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP

En NeorniPharma, siempre buscamos la mejor solución a largo plazo. Buscamos constantemente **alternativas** a **los antimicrobianos** para reducir el riesgo de resistencia. El objetivo debería ser tratar a nuestras aves **lo menos posible de forma preventiva con anti-microbianos**. Para ello, la investigación clínica y posiblemente las pruebas adicionales son cruciales. Una vez que se ha hecho un diagnóstico correcto, se puede iniciar un tratamiento adecuado. **Los antibióticos no son inocuos**. Consulte a su veterinario para un uso correcto y responsable. **Autopsias:** ¡no tire las aves muertas sin más! Una autopsia puede proporcionar mucha información para llegar a un tratamiento adecuado. Lo mejor es mantener las aves en frío (nevera) y examinarlas en un plazo de 24 horas (máx. 72 horas).

Calendario de vacunación de palomas

INTERVALO DE 3-4 SEMANAS

Crías

6 semanas de edad	Rotavirus-paramixovirosis	
8 semanas de edad	Salmonela/paratifosis-herpes	NEORNIVET)
10 semanas de edad	Viruela (inyección/método folicular)	¿Necesita ase-
3-4 semanas antes del adiestramiento	Rotavirus-paramixovirosis REFUERZO	soramiento? Su veterinario Neorni
Mediados de junio - principios de julio*	Paramixovirosis-herpes REFUERZO (HERPES)	

CALENDARIO La secuencia y repetición de las vacunas viene determinada en parte por la presión infecciosa de su palomar. Póngase en contacto con NeorniVet para que le orienten al respecto.

ENFERMEDAD DE LAS PALOMAS JÓVENES Una **doble vacunación**con 3-4 semanas de intervalo contra el **rotavirus** ofrece la mejor protección contra la enfermedad de las palomas jóvenes ('adeno' en lenguaje popular). En caso de fuerte presión infecciosa, un **tercer refuerzo** 3 semanas antes del adiestramiento. La vacunación contra el adenovirus y el circovirus no se recomienda debido a la efectividad no probada y a la falta de cepas específicas de palomas.

REFUERZO Refuerce a sus palomas jóvenes durante el período de vacunación en las primeras 6 semanas después del destete con Immuno-Plus, Dysbac Liquid y Trichoryza Drops.



Palomas adultas y de un año

 Mediados de febrero
 Viruela (inyección/método folicular) MEJOR CON PALOMAS DE UN AÑO

 Finales de febrero
 Paramixovirosis-herpes

 14 días después
 Salmonela/paratifosis**

REFUERZO Acompañe de manera óptima a sus palomas adultas y de un año hacia el inicio de la nueva temporada con **Trichoryza Drops**, **Dysbac Liquid** y **Ready**.



Palomas reproductoras

6-7 semanas antes de la reproducción

Mediados de octubre

Salmonela/paratifosis**

Paramixovirosis-herpes

SALMONELLA/PARATIFOSIS Dependiendo de la presión de infección y de la inmunidad, puede ser necesario o no tratar a las palomas antes de la vacunación y vacunar una o dos veces.

HERPES En caso de problemas de herpes durante la cría de las palomas jóvenes, se recomienda vacunar a las palomas reproductoras dos veces contra el herpes.

PARAMIXOVIROSIS La vacunación anual contra la paramixovirosis es obligatoria para las palomas reproductoras.


REFUERZO Estimule a las palomas reproductoras 2 semanas antes del apareamiento hasta la primera puesta con Vita-Min-DCP e Immuno-Plus. Dificultades en la fecundación/machos viejos: complemente con Vit E + Se.



^{**} Posiblemente tras tratamiento preventivo en caso de infección previa



54



PROGRAMAS DE PALOMAS



Reproducción



2 semanas antes de la reproducción hasta la puesta

Trichoryza Drops	Vita-Min-DCP	Immuno-Plus
10 g/kg de alimento	2 ml/l	2 ml/l
Durante la incubación	2 semanas antes del aparea- miento hasta la primera puesta	2 semanas antes del aparea- miento hasta la primera puesta
Durante 3 días consecutivos	2 días/semana	A diario
Eficacia probada en tricomonas resistentes	Extra de calcio, fósforo, vitamina D3 y oligoelementos	Estimulación de la producción de espermatozoides y óvulos

Durante la incubación

56

Tricho Geel

3 g/l de agua o 6 g/kg de alimento

Durante la incubación

Durante 5 días consecutivos

Reducir la presión de las tricomonas + evitar la hexamitiasis en los ióvenes





Desde la eclosión hasta el destete

Immuno Booster NEW+ Feather Energy	Trichoryza Drops	Aminovital
20 g/kg alimento + 5 ml/kg alimento	10 g/kg de alimento	2-5 ml/l
Desde la eclosión hasta el destete	Reproducción completa	Desde la eclosión hasta el destete
2-3 días a la semana	Durante 1 día cada 2 semanas	3 días/semana
Premezcla todo incluido	Eficacia probada en tricomonas resistentes	Aminoácidos y vitaminas extra para un crecimiento rápido



Preparación al vuelo

AVES VIEJAS Y DE UN AÑO DE EDAD







Trichoryza Drops

Dysbac Liquid

Ready

E

10 ml/kg

2 ml/l

5 ml/l

(

1 día cada 2 semanas

2 días/semana

Diariamente durante 2 semanas ante del inicio de la temporada de vuelo

£03

Eficacia probada contra los tricomonas resistentes

Salud intestinal, del buche y del proventrículo, heces sólidas

Mejora de la forma y condición física



Entrenamiento insuficiente: durante 14 días Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l).

PALOMAS JÓVENES "JUNIOR"







Immuno Booster NEW

Trichoryza Drops

Dysbac Liquid



20 g/kg

10 ml/kg

2 días/semana



2-3 días/semana durante 6-8 semanas, después 1 día/semana durante toda la temporada de vuelo

1 día cada 2 semanas

(0)

Crecimiento y energía, previene las carencias nutricionales

tricacia probada contra los

Salud intestinal, del buche y del proventrículo, heces sólidas



Entrenamiento insuficiente: durante 14 días Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l).



>>>> Este programa da una indicación de cómo pueden utilizarse los productos NeorniPharma en determinadas circunstancias. Nuestro objetivo es desarrollar un programa adecuado y completo con el menor número de productos posible. Todos estos suplementos pueden combinarse según sea necesario. En caso de malos resultados, buscaremos juntos la causa y se harán los ajustes o tratamientos adecuados. <u>Atención</u>: los suplementos alimentícios se preparan mejor el día anterior para que se impregnen pien y las palomas absorban mejor el alimento.

NEORNI PHARMA
BY VETS FOR BIRDS



Temporada de vuelo

VELOCIDAD BAJA







Dysbac Liquid

П	_		7
ш	_		•
ш			
• 1	-		
	_	_	,

10 ml/kg

2 ml/l



Día después de la llegada a casa

Principio de semana



Durante 1 día



Eficacia probada contra los tricomonas resistentes

Salud intestinal, del buche y del proventrículo, heces sólidas



Pellizcar la fosa nasal, echar una gota, dejar que la gota

58

ALTA VELOCIDAD - MEDIO FONDO



Aminovital 5 ml/l



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready





10 ml/kg

2 ml/l





Llegada a casa

Día después de la llegada a casa

Principio de semana

5 ml/l Antes del encestado





Durante 1-2 días

Gran velocidad: 1 día





Eficacia probada

Salud intestinal, del buche y del proventrículo, heces sólidas

Condición física



que la gota entre en la fosa nasal

durante 10 días, junto con Immuno-Plus

59



Recuperación







Aminovital



Immuno Booster NEW



1 cápsula/paloma

5 ml/l

20 g/kg



Recuperación rápida

Recuperación rápida

Mantenimiento



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Respicor



10 ml/kg

2 ml/l

3 ml/l





Eficacia probada contra los

Salud intestinal, del buche y del proventrículo, heces sólidas

Vías aéreas, picos blancos

Extra antes del encestado



Feather	Energy
---------	--------





Immuno-Plus



5 ml/kg 10 g/kg de alimento

2 ml/l

5 g/2 l



Energía rica en grasas

Estimula una buena condición física

Energía extra

Absorción adicional de

































Muda Refuerzo





Tratamiento de ectoparásitos



60

Preparación de la reproducción

Cuando la temporada de palomas termina a finales de septiembre o principios de octubre, recomendamos encarecidamente **recoger durante 5 días las heces de las palomas reproductoras y mandarlas a analizar**. Se analizan las heces en busca de lombrices, coccidiosis, levaduras u hongos y luego se someten a un cultivo para el control de la paratifoidea y la salmonela. En función de los resultados, se puede elaborar un plan de vacunación.

		Paratifoidea/salmonela NEGATIVO	Paratifoidea/salmonela POSITIVO
Tratamiento		No necesario	Necesario durante 10 días según el antibiograma
Vacunación	SALMONELL Shakara Shaka Shaka Shaka Shaka Shaka Sha Shaka Sha Shaka Shaka Sha Shaka Sha Sha Sha Sha Sha Sha Sha Sha Sha Sh	Muy recomendado	Necesario
Momento de vacunación	Calledon Anderson Indicate Virtually or in the dispursary because it is not in the dispursary	6-8 semanas antes del apareamiento	2 días después del tratamiento



Elabore un plan de acción adaptado a su corral o problema con nuestra consulta veterinaria NeorniVet (+32 (0)11 96 91 02)

Análisis de heces

- · Recoja las heces a diario durante 5 días y guárdelas en el frigorífico
- Envíe las heces o lleve la muestra a su veterinario
- Si se desea, se puede realizar un análisis de las palomas al mismo tiempo
- · No importa si las palomas todavía están mudando





PROGRAMA DE PSITACIFORMES



Psitaciformes LOROS Y PERIQUITOS

Salud general



Para prevenir las carencias crónicas Todo el año 1-2 días/semana Vita-Plus o Vita-Energy

Reproducción

PREVENCIÓN

6-8 semanas antes de la reproducción Control de heces de 3-5 días (veterinario)

- Si es necesario, desparasite con Vermi-Complete
 - Grupo: 5 ml/l de agua
- Individual: 1 ml/kg de peso corporal en la boca Control de ectoparásitos
- Grupo: Vermi-Complete 1 ml/l agua de baño
- Individual:
 - < 250 g: Endo-Ecto Kanarie
 - > 250 g: V-Exmite Drops

ESTIMULACIÓN

diariamente 4-6 semanas antes de la reproducción

Vita Energy + Immuno-Plus Juntos en el agua o el alimento





CRÍA diariamente

desde la eclosión hasta la autonomía Crianza natural:

• Immuno Booster NEW 2 g/100 g de alimento (concentrado) + Immuno-Plus 0,2 ml/100 ml de agua Crianza a mano:

 Immuno Booster NEW 2 g/100 g de alimento 1 vez/día + Immuno-Plus 1 ml/kg de peso corporal 1 vez/día



62

Problemas digestivos y del buche



Control (veterinario):

- Análisis de enfermedades mediante sangre plumas hisopado cloacal
- · Hisopado del buche


Muda - Plumado




SilverSpray

Nuevo spray desinfectante









PROGRAMAS DE POLLOS



Calendario de vacunación



Pollitos

Refuerzo

Según se necesite:

- Primeros 14 días de vida Inmuno Booster NEW (20 g/kg de alimento)
- Vitaminas generales: 3 días/semana Vita-Plus (2 ml/l)
- Salud intestinal + prebióticos: 2 días/semana Dysbac Liquid (2 ml/l)
- Crecimiento extra + aminoácidos: 2 días/semana Aminovital (2 ml/l) + Immuno-Plus (2 ml/l)

Vacunación

NORMA DORADA: 3 vacunas (Marek, NCD y viruela)

D1 (1.ª semana de vida)	Marek (2 cepas) + IBD + NCD (inyección)	NEORNIVET)
D1 (1.ª semana de vida)	Bronquitis infecciosa (colirio)	¿Necesita ase- soramiento?
1.ª semana de vida	Coccidiosis (agua)	Su veterinario Neorni estará encantado de avudarle

Pollos en crecimiento (a partir de 7 semanas) y pollos adultos

Refuerzo

66

- Vitaminas generales: Vita-Plus (2 ml/l). Preventivo: 2 días/semana. Tras tratamiento: durante 7 días.
- Salud intestinal + prebióticos: Dysbac Liquid (2 ml/l). Preventivo: 2 días/ semana. Con heces planas: durante 7 días.
- Refuerzo de las vías respiratorias: Respicor (3 ml/l). Preventivo: 2 días/ semana. Con problemas en las vías respiratorias: durante 7-14 días.

Vacunación

Mayo-junio (¡anual!)	Viruela (+ ILT)
Mayo-junio (¡anual!)	NCD (inyección/agua)
Agosto-septiembre	NCD (aceite de inyección) Obligatorio para las exposiciones y venta
Agosto-septiembre	Bronquitis infecciosa (agua)

Consejos para todas las edades

 NORMA DORADA: 3 vacunas (Marek, NCD y viruela). Las demás vacunas son una ampliación de áreas problemáticas específicas y no se recomiendan de forma rutinaria.

NFORN

¿Necesita asesoramiento?



Salud general



Todo el año 1 día/semana Vita-Plus (2 ml/l) Durante la muda 3 días/semana Aminovital y Condi-Plus (2 ml/l)

Cáscaras finas

vita-i

Vita-Min-DCP durante 21 días

- Grupo: 5 ml/l o 10 ml/kg alimento
- Individualmente por la boca: 1 ml/kg PC

Desparasitar los días 1, 7 y 21

- Grupo: Vermi-Complete 5 ml/l
- Individualmente por la boca: Endo-Ecto Plus Caps:
 1 cápsula/kg PC, o Vermi-Complete 1 ml/kg PC

Revise las heces cada 3-4 meses:

 Analice también las heces de 2-3 días en busca de endoparásitos. Estos pueden provocar deficiencias, y por lo tanto, del escamado

Vacunación RT+IBmulti+ND+EDS

 Infecciones víricas y malformaciones cerca de la trompa de Falopio



67

Mucosidad



Preventivo

Infección leve + animal nuevo 7-14 días Respicor (3 ml/l)

Cuello torcido/tortícolis



Cuello torcido 14-21 días Vit E + Se

Grupo: 2 ml/l **Individual (boca):** 0,2-0,5 ml/kg PC

Exhibiciones



Condición general 7 días antes de la exhibición Immuno-Plus (2 ml/l) Piernas más amarillas

14-21 días antes de la exhibición

PURO Amarillo 1-2 g/kg

Si los problemas persisten, lo mejor es concertar una cita con el veterinario

Precios de exportación

A continuación figuran nuestros precios de exportación para particulares y profesionales. Estos precios son **sin IVA**. Al realizar el envío se aplican los tipos de IVA del país de destino. Los profesionales están exentos del IVA.

PRODUCTO	€ sin IVA	PRODUCTO	€ sin IVA
Immuno Booster NEW (1 kg)	53,72	Trichoryza Drops (50 ml)	14,05
Immuno-Plus (100 ml)	20,66	Trichoryza Drops (250 ml)	48,76
Immuno-Plus (250 ml)	45,45	Trichoryza Drops (1 l)	136,36
Immuno-Plus (1 l)	147,93	Aminovital (100 ml)	15,70
Immuno Recup Caps (80 c)	19,83	Aminovital (250 ml)	28,93
Super Start-Up (200 g)	20,66	Aminovital (1 l)	53,72
Vit E + Se (100 ml)	14,05	Condi-Plus (250 ml)	21,49
Vit E + Se (250 ml)	28,93	Vita Energy (400 g)	24,79
Hepa-Plus (100 ml)	16,53	Vita-Min-DCP (100 ml)	16,53
Hepa-Plus (250 ml)	29,75	Vita-Min-DCP (250 ml)	28,93
Hepa-Plus (1 l)	65,29	Vita-Min-DCP (1 I)	57,85
Ready (100 ml)	18,18	Vita-Plus (100 ml)	14,88
Ready (250 ml)	39,67	Vita-Plus (250 ml)	23,14
Dysbac Liquid (250 ml)	30,58	Vita-Plus (1 l)	53,72
Feather Energy (400 ml)	15,70		
PikStop (100 ml)	23,14	PURO	
Respicor (100 ml)	15,70	Levadura de cerveza (1 kg)	14,88
Respicor (250 ml)	28,93	Dextrosa (1 kg)	14,88
Neorni Stabilizer (1 l)	16,53	Electrolitos (500 g)	14,88
Probi-Plus (150 g)	14,88	Amarillo (100 g)	12,40
SilverSpray (500 ml)	12,40	Amarillo (500 g)	49,59
Skin Spray (200 ml)	14,05	Proteína de alta digestibilidad (400 g)	20,66
CU-For Liquid (250 ml)	12,40	Rojo (100 g)	23,14
SilverFlox (1 l)	26,45	Rojo (500 g)	70,25



Índice

Amarillo	44
Aminovital	38
Calendario de vacunación de palomas	54
Condi-Plus	
CU-For Liquid	34
Dextrosa	44
Disbacteriosis	18
Dysbac Liquid	19
Electrolitos	44
Feather Energy	22
Fomento natural de la reproducción	6
Hepa-Plus	14
Immuno Booster NEW	7
Immuno-Plus	8
Immuno Recup Caps	9
Levadura de cerveza	44
Neorni Stabilizer	
PikStop	24
Probi-Plus	
Programas de aves canoras	
Programas de palomas	
Programas de pollos	
Programas de psitaciformes	
Proteína de alta digestibilidad	44
Ready	
Respicor	
Rojo	
SilverFlox	
SilverSpray	
Skin Spray	
Super Start-Up	
Tratamiento de fertilidad	
Trichoryza Drops	
Vita Energy	
Vita-Min-DCP	
Vita-Plus	42
Vit F + Se	11



ES

T +32 (0)11 96 91 02

E info@neornipharma.be

W www.neornipharma.be

Mostrador y almacén:

Beverlosesteenweg 129 3583 Paal, Bélgica

