

SUPLEMENTOS

2026



**NEORNI
PHARMA**

NEORNIPHARMA SUPLEMENTOS

PREVENÇÃO FEITA À MEDIDA PARA AS SUAS AVES

Este catálogo faculta uma visão geral da gama NeorniPharma que visa **prevenir doenças através de suplementos naturais e altamente concentrados**. Esta gama oferece uma alternativa segura e bem sucedida aos tratamentos medicinais e uma solução a longo prazo. Ao visar as áreas problemáticas anuais, a NeorniPharma pretende desenvolver a imunidade e, conseqüentemente, aves mais fortes.

Endereço de recepção

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Bélgica

Número de telefone

+32 (0)11 96 91 02

Doses adicionais de pós

Descubra as doses alternativas na nossa tabela de dosagens "Pós e cápsulas" neste catálogo.



Espécies de aves neste catálogo



Pombos



Aves
canoras



Aves de
capoeira



Papagaios



Aves de
rapina

Todos os produtos NeorniPharma têm fórmulas únicas e são concebidos por veterinários com base na investigação científica e na experiência prática.

Reprodução e imunidade

PRODUTO	DOSAGEM	INDICAÇÃO	PREÇO (€)
Immuno Booster NEW (1 kg)	20 g/kg de ração (ovo)	All-in premix	65
Immuno-Plus (100 ml)	2 ml/l	Imunidade, energia extra, reprodução	25
Immuno-Plus (250 ml)	2 ml/l	Imunidade, energia extra, reprodução	55
Immuno-Plus (1 l)	2 ml/l	Imunidade, energia extra, reprodução	179
Immuno Recup Caps (80 c)	1 cápsula/0,5-1 kgPC	Imunidade, recuperação, energia	24
Super Start-Up (200 g)	5 g/kg de ração	Suplemento de iniciação para aves jovens, mancha negra	25
Vit E + Se (100 ml)	2 ml/l	Vitamina E + selénio extra	17
Vit E + Se (250 ml)	2 ml/l	Vitamina E + selénio extra	35

Fígado, músculos e nutrição

PRODUTO	DOSAGEM	INDICAÇÃO	PREÇO (€)
Hepa-Plus (100 ml)	4 ml/l	Alívio do fígado	20
Hepa-Plus (250 ml)	4 ml/l	Alívio do fígado	36
Hepa-Plus (1 l)	4 ml/l	Alívio do fígado	79
Ready (100 ml)	5 ml/l	Forma, aptidão física e melhoria da circulação	22
Ready (250 ml)	5 ml/l	Forma, aptidão física e melhoria da circulação	48

Megabactérias e disbacteriose

PRODUTO	DOSAGEM	INDICAÇÃO	PREÇO (€)
Dysbac Liquid (250 ml)	2 ml/l	Saúde ao nível do papo, glândulas digestivas e intestinos	37

Óleos naturais

PRODUTO	DOSAGEM	INDICAÇÃO	PREÇO (€)
Feather Energy (400 ml)	5 ml/kg de ração	Óleo para voo	19
PikStop (100 ml)	1 ml/l	Agitação	28
Respicor (100 ml)	3 ml/l	Vias respiratórias, stress térmico	19
Respicor (250 ml)	3 ml/l	Vias respiratórias, stress térmico	35

Probióticos e desinfecção

PRODUTO	DOSAGEM	INDICAÇÃO	PREÇO (€)
Neorni Stabilizer (1 l)	5-10 ml/100 ml	Probióticos - ambiente	20
Probi-Plus (150 g)	3 g/l	Probióticos e pré-bióticos	18
SilverSpray (500 ml)	Spray	Spray desinfetante	15
Skin Spray (200 ml)	Spray	Probiótico - infeções cutâneas	17

Acidificação e desinfecção da água de bebida

PRODUTO	DOSAGEM	INDICAÇÃO	PREÇO (€)
CU-For Liquid (250 ml)	1-2 ml/l	Acidificação da água de bebida	15
SilverFloX (1 l)	2 ml/l	Desinfecção da água de bebida	32
Trichoryza Drops (50 ml)	1 gota/narina	Elixir para o papo	17
Trichoryza Drops (250 ml)	10 ml/kg	Elixir para o papo	59
Trichoryza Drops (1 l)	10 ml/kg	Elixir para o papo	165

Vitaminas, aminoácidos, eletrólitos, minerais e oligoelementos

PRODUTO	DOSAGEM	INDICAÇÃO	PREÇO (€)
Aminovital (100 ml)	2 ml/l	Aminoácidos, eletrólitos e vitaminas	19
Aminovital (250 ml)	2 ml/l	Aminoácidos, eletrólitos e vitaminas	35
Aminovital (1 l)	2 ml/l	Aminoácidos, eletrólitos e vitaminas	65
Condi-Plus (250 ml)	2 ml/l	Suplementos para a muda	26
Vita Energy (400 g)	10 g/kg de ração	Pó de condicionamento - vitaminas, minerais e aminoácidos	30
Vita-Min-DCP (100 ml)	2 ml/l	Vitamina D, cálcio, fósforo e outros minerais	20
Vita-Min-DCP (250 ml)	2 ml/l	Vitamina D, cálcio, fósforo e outros minerais	35
Vita-Min-DCP (1 l)	2 ml/l	Vitamina D, cálcio, fósforo e outros minerais	70
Vita-Plus (100 ml)	2 ml/l	Multivitaminas solúveis em água	18
Vita-Plus (250 ml)	2 ml/l	Multivitaminas solúveis em água	28
Vita-Plus (1 l)	2 ml/l	Multivitaminas solúveis em água	65

PURO

PRODUTO	DOSAGEM	INDICAÇÃO	PREÇO (€)
Levedura de cerveja (1 kg)	15-30 g/kg de ração	Aminoácidos, minerais, oligoelementos, vitamina B	18
Dextrose (1 kg)	15-30 g/l	Energia, sabor	18
Eletrólito (500 g)	15-30 g/l	Hidratação, estabilização, equilíbrio	18
Amarelo (100 g)	1-2 g/kg de ração	Corante	15
Amarelo (500 g)	1-2 g/kg de ração	Corante	60
Proteína de elevada digestibilidade (400 g)	5-15 g/kg de ração	Crescimento muscular, aminoácidos/proteínas adicionais	25
Vermelho (100 g)	1 g/kg de ração	Corante	28
Vermelho (500 g)	1 g/kg de ração	Corante	85

Todos os preços anunciados incluem o IVA cobrado na Bélgica (21%)

NEORNI

A NeorniPharma faz parte da Neorni, uma equipa de veterinários que se dedica especificamente à medicina aviária. A Neorni oferece vários serviços para garantir o melhor tratamento das aves.

Siga-nos
no Facebook



www.neorni.be
www.neornilab.be



NeorniVet Huldenberg

huldenberg@neornivet.be
ABERTURA EM 2026



NEORNIVET

Consultório veterinário

NeorniVet Paal
NeorniVet Huldenberg



NEORNILAB

Laboratório

Género • Genes de desempenho • Parentesco • Autópsia • Testes de doenças • Bacteriologia • Determinação das espécies • Estudo de estresse • Mutações de cor

NEORNI



PHARMA


BY VETS FOR BIRDS

Gama de produtos



Neorni (todos os serviços)

Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Bélgica
T +32 (0)11 96 91 02



REPRODUÇÃO E IMUNIDADE



Promoção da reprodução natural

Reprodução básica

O diagrama básico de reprodução é a essência para se conseguir uma reprodução bem-sucedida. Em vários ensaios de campo, as aves parecem estar mais bem preparadas para a reprodução, o que se reflete em múltiplos ninhos e várias crias por ninhada.



Immuno-Plus

2 ml/l ou 4 ml/kg

Antes da reprodução:
diariamente durante 2 a 6 semanas até à primeira postura

Unidade de reprodução
+++

Polipéptidos

Estimulação de oócitos e produção de esperma



Immuno Booster NEW

20 g/kg de ração (ovo)

Durante a reprodução:
diariamente desde a primeira postura até ao depósito das crias

Unidade de reprodução +

Polipéptidos e Reprodução e criação pré-misturas

Manutenção de oócitos e produção de esperma



Precisa de aconselhamento?

O seu veterinário Neorni terá todo o prazer em ajudá-lo(a)



Vit E + Se

2 ml/l ou 4 ml/kg

Uso diário 2 a 4 semanas da reprodução até à primeira postura

Fertilidade +++

Óleo de linhaça, arginina, espirulina, carnitina, zinco, etc.

Dose extra elevada de Vit E + Se

6

Reprodução extra (fertilização)

Os problemas de fertilização que ocorrem após a aplicação do diagrama de base têm frequentemente uma causa nutricional ou infecciosa.

►► As causas nutricionais podem beneficiar certamente de um suplemento

Vit E + Se .

►► Além disso, nos últimos anos, foram isolados alguns germes com um impacto significativo na fertilização. A cultura de estrume antes da reprodução pode ser realizada fácil e rapidamente na clínica veterinária NeorniVet ($\pm$ 24h).

►► Em certas situações/espécies específicas, pode ser criada mais-valia através da adição de suplementos específicos, tais como **Vita-Plus**, **Ready**, **Hepa-Plus** etc.



IMMUNO BOOSTER NEW



Pré-mistura completa para aves jovens



Indicação

- Favorece os resultados da reprodução e mantém as suas aves em forma
- Fornecimento adicional de energia
- Apoia o sistema imunitário
- Ajuda a desenvolver a flora intestinal através da presença de probióticos
- Bom desenvolvimento ósseo
- Ideal para animais que exigem um desempenho de topo

Administração 20 g/kg

- 1 colher grande (20 g)/kg de ração (ovo) ou 2 colheres pequenas (2 g)/100 g de ração (ovo)
- Durante a época de reprodução: adicionar diariamente à ração (ovo)
- Energia extra e absorção dos défices: 1 a 2 dias por semana ao longo do ano

Glúten de milho, proteína de batata, fermentado de proteína de batata, levedura e respetivas partes, fibra de raiz de chicória, espirulina, levedura, citrato de trimagnésio, mono, di e triglicéridos de ácidos gordos (c4), citrato tricálcico, L-carnitina, betaína, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina C, vitamina B1, vitamina B2, D-pantotenato de cálcio, vitamina B6, vitamina B12, vitamina K, niacinamida, ácido fólico, colina, clinoptilolite, cobre, ferro, zinco, manganês, iodeto de potássio, selénio, cobalto, lisina, metionina, glicina, equináceas purpúreas, curcuma, lactobacillus acidophilus





Imunidade, energia extra, reprodução



100 ml 25 €

250 ml 55 €

1 l 179 €

«Viagra para pássaros»

8

Indicação

- Favorece os resultados da reprodução e mantém as suas aves em forma
- Fornecimento adicional de energia
- Bom apetite e plumagem
- Para utilizar antes/depois de exercícios/competições extenuantes
- Apoia o desenvolvimento e o crescimento dos animais jovens

Administração 2 ml/l de água de bebida

- Reprodução: diariamente, de 2 a 6 semanas antes da reprodução. Parar a administração a partir da primeira postura.
- Exposições/competições: a partir de 5 dias antes da exposição/competição, 2 ml/l de água de bebida ou 2 ml/kg de peso corporal diretamente no bico
- Imunossupressão e doença: 2 ml/l de água de bebida durante 14 dias ou 2 ml/kg de peso corporal diretamente no bico até à recuperação
- Infecções virais (circovírus, bornavírus...): durante 4 a 8 semanas para apoiar e promover a imunidade



Imunidade, recuperação, energia



80 cápsulas

24 €

Indicação

- Favorece a recuperação após doença/esforço
- Fornecimento adicional de energia
- Apoia o sistema imunitário
- Ideal para um desempenho de topo

Administração

- Reforço da recuperação/imunidade: 1 cápsula/0,5-1kg por via oral durante 5 a 10 dias
- Energia extra: 1 cápsula/0,5-1kg por via oral
- Pombo: dia de chegada ao domicílio, 1 cápsula/pombo
- Apoio à reprodução: durante 14 dias antes do acasalamento até à postura: 1 cápsula/0,5-1kg
- O *Immuno Recup Caps* pode ser administrado diretamente ou através de alimentos. Quando administrado através dos alimentos, deve ser consumida a dose completa.

Glúten de milho, proteína de batata, proteína fermentativa de batata, levedura e respetivas partes, fibra de raiz de chicória, espirulina, levedura, citrato de trimagnésio, mono, di e triglicéridos de ácidos gordos (c4), citrato tricálcico, L-carnitina, Vit A, Vit D3, Vit E, Vit C, Vit B1, Vit B2, D-pantotenato de cálcio, Vit B6, Vit B12, Vit K, niacinamida, ácido fólico, colina, clinoptilolite, cobre, ferro, zinco, mangânês, iodeto de potássio, selénio, cobalto, lisina, metionina, glicina, equináceas purpúreas, curcuma, lactobacillus acidophilus



Suplemento de iniciação para aves jovens, mancha negra



200 g 25 €

10

Indicação

- Iniciação suave das suas aves jovens nas primeiras 6 semanas de vida
- Supressão natural da enterite bacteriana e necrótica/diarreia
- Crescimento rápido e aves maiores, devido a um início suave e à supressão natural da mancha negra

Administração 5 g/kg de ração (ovo)

- Diariamente, desde a primeira ninhada até ao depósito das crias

VIT E + SE



Vitamina E + selénio extra



100 ml 17 €

250 ml 35 €

+ espirulina
+ zinco
+ óleo de
linhaça

Indicação

- Para animais com deficiência de vitamina E e selénio
- Recomendado para sintomas nervosos

Administração

- 2 ml/l de água de bebida ou 1 ml/kg de peso corporal diretamente no bico
- Aconselhamento para sintomas nervosos: durante 7 a 10 dias




Fertilidade +++

Diariamente 2 ml/l ou 4 ml/kg de ração, durante 2 a 4 semanas, antes da reprodução até à primeira postura

Terapia de fertilidade

Terapia individual (pombos-machos ♂ e pombas-fêmeas ♀)





FÍGADO, MÚSCULOS E NUTRIÇÃO



Alívio do fígado



14

Indicação

- Apoia a função hepática
- Alivia o fígado

Administração

- Tratamento: 4 ml/l de água de bebida durante 5 a 14 dias
- Prevenção: 2 ml/l de água de bebida, 2 a 3 dias por semana



Pode ser administrado diariamente para apoiar o fígado durante a administração de medicamentos ou corantes



Forma, aptidão física e melhoria da circulação



100 ml 22 €

250 ml 48 €

Ferro adicional, iodo, L-carnitina e vitamina B12

Indicação

- Reforço nutritivo: para melhorar o desempenho de voo
- Estimula o metabolismo da gordura e a resistência
- Apoiar a circulação sanguínea


Administração 5 ml/l de água de bebida

- **Impulso nutritivo:**
 - Para exposições/época de voo: durante 2 semanas
 - Para voos importantes: durante 2 a 5 dias
- **Aves gordas:** durante 3 a 5 dias por semana até obter o resultado desejado
- **Anemia** 7 a 10 dias
- Dose ajustada para aves canoras com < 250 g de peso corporal (canário, pintassilgo, etc.): 1-2 ml/l

Glicerol, L-carnitina, sumo de beterraba, iodeto de potássio, glicinato de ferro, vitamina B12, citrato de magnésio, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, cloreto de cálcio, glicose, vitamina E, selénio, zinco, cobre, manganês, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5, vitamina B6, vitamina PP (niacinamida), vitamina D3, vitamina C, mistura de componentes aromáticos naturais

Notas

[illegible]



MEGABACTÉRIAS E DISBACTERIOSE

Disbacteriose

papo
glândula
intestinal
intestinos



Dysbac Liquid
prevenção da
disbacteriose

7 em 1
Saúde intestinal
em 7 frentes

Dysbac Liquid é uma versão melhorada e
alargada do **CU-For Liquid**
com maior incidência
na **saúde intestinal** e
imunidade geral

18



2 ml/l

+

+++

+++

+++

+++

**SAÚDE DO PAPO, GLÂNDU-
LAS INTESTINAIS E INTES-
TINOS, PREVENÇÃO DA
DISBACTERIOSE**

➤ **Ácidos gordos de cadeia**

curta: ácido fórmico, ácido
propiónico, ácido cítrico

➤ **Ácidos gordos de cadeia**

média: ácido butírico, mono, di
e triglicéridos de ácidos gordos
(C8-C10)

➤ **Substâncias aromáticas:**

orégãos, equináceas purpúreas,
gingibre, canela, pimenta preta,
alho e boswellia

➤ **Vitamina C**

➤ **Quelato de cobre e zinco**

➤ **Fibras adicionais**

➤ **Óleo de peixe**

DOSAGEM

PURIFICAÇÃO DA ÁGUA DE BEBIDA (pH)

SAÚDE DO PAPO

SAÚDE GLANDULAR DO ESTÔMAGO

SAÚDE INTESTINAL

IMUNIDADE GERAL

OBJETIVO



**Precisa de conse-
lhamento?**

O seu veterinário Neorni
terá todo o prazer em
ajudá-lo(a)



1-2 ml/l

+++

+++

++

-

-

**ACIDIFICAÇÃO DA ÁGUA,
QUALIDADE DA ÁGUA**

➤ **Ácidos gordos de cadeia**

curta: formiato de amônio,
ácido acético, ácido láctico, ácido
fórmico, ácido propiónico

➤ **Sulfato de cobre e de zinco**



Saúde do papo, estômago e intestinos



Indicação

- Forma uma película protetora na mucosa intestinal
- Aumenta a resistência do organismo
- Ajuda a manter o equilíbrio natural da flora intestinal
- A utilizar em caso de estrume em excesso

Administração 2 ml/l de água de bebida

- Prevenção: 1 a 2 dias por semana
- Em caso de problemas digestivos: durante 7 a 14 dias



-Prevenção da megabacteriose e disbacteriose

- 1 a 2 dias por semana 2 ml/l água de bebida
- Pode ser dado em conjunto com o ACS

Monobutirina, fibras pré-bióticas, óleo de peixe, ácidos gordos de cadeia média, cloreto de sódio, glicerol, zinco, cobre, ácido fórmico, ácido propiónico, ácido cítrico, 10 estirpes diferentes de orégãos, equináceas purpureas, canela, tomilho, Boswellia, pimenta preta, óleos essenciais microfundidos, vitamina C

Trichoryza Drops

A abordagem da tricomoníase
sem perda de forma

ÉPOCA DE VOO
1 dia/semana, no dia seguinte ao regresso a casa
10 ml/kg
de ração

NOVIDADE
1 litro



**Eficácia comprovada
contra a tricomoníase
resistente!**



ÓLEOS NATURAIS



Óleo de voo, fonte de energia de gordura



400 ml 19 €

NOVIDADE

22

Indicação

- Fonte de energia de gordura
- Qualidade da pena, ótima emplumação
- Vitaminas A, D e E extra
- Fonte elevada de ácidos gordos ómega 3-6-9

Administração 5 ml/kg de ração

- Muda: 2 dias por semana
- Reprodução: 2 a 3 dias por semana
- Época de voo:
 - Partida: durante 2 a 5 dias antes do encestamento em combinação com *Vita Energy*
 - Regresso a casa: durante 2 dias em combinação com *Immuno Booster NEW*



Pode ser utilizado para melhorar a absorção do *Immuno Booster NEW* e do *Vita Energy* com a ração

Óleos prensados a frio: óleo de linhaça, óleo de fígado de bacalhau, óleo de colza, óleo de salmão, lecitina, óleo de gérmen de milho, óleo de gérmen de trigo, óleo de girassol, óleo de sementes de cânhamo (incluindo vitaminas A, D e E)

Notas

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple sets of horizontal lines designed to guide handwriting. Each set consists of three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. These sets are repeated vertically down the entire page, providing ample space for practicing letter formation and alignment. The paper is otherwise blank, with no margins or additional markings.



Bicadas, agitação



100 ml 28 €

NOVIDADE

24

Indicação

- Bicadas por pássaros e aves de capoeira

Administração

- 1 ml/l de água de bebida durante 4 a 6 semanas



Depenagem/bicadas

Administrar em simultâneo com *Immuno-Plus* para melhores resultados



Vias respiratórias, stress térmico



100 ml 19 €

250 ml 35 €

anteriormente
Herbi+E

Indicação

- Solução natural para combater problemas respiratórios
- Supressão da dor/inflamação em caso de problemas respiratórios
- Muco preso
- Stress térmico

Administração 3 ml/l de água de bebida ou 0,5 ml/kg de peso corporal diretamente no bico

- Prevenção: aquando da compra de novos animais, durante 10 a 14 dias
- Tratamento: em problemas respiratórios ligeiros a moderados, durante 10 a 14 dias
- Stress térmico: 3-5 ml/l



Apoio adicional para pombos-correio em tempo quente 3 ml/l de água de bebida, em combinação com *Aminovital* no dia do encestamento

Vitamina A, vitamina C, curcuma, salva, sabugueiro, tomilho, orégãos, hortelã, eucalipto, equinácea, grindélia, cravinho, urtiga, alecrim


2026

neofalco

produtos para falcões



mais informações: info@neornipharma.be



PROBIÓTICOS E DESINFECÇÃO



Spray ambiental probiótico



1 | 20 €

28

Indicação

- Diminuição da pressão dos agentes patogénicos no ambiente das suas aves
- Forma um ambiente estável e saudável, ocupando-o com bactérias seguras e probióticas

Administração

- Diluição a utilizar: 5 a 10% (5 a 10 ml/100 ml) em água morna
- Pulverizar a totalidade da zona a estabilizar
- Na primeira semana, pulverizar diariamente no pombal/galinheiro (pode pulverizar na presença das aves, mesmo das crias em ninho)
- Em seguida, pulverizar duas vezes por semana para manter a proteção probiótica
- O produto diluído em água pode ser conservado até 5 dias



• Pode ser pulverizado na presença das aves/pombos, especialmente durante períodos importantes ou stressantes, quando a pressão ambiental bacteriana aumenta

Notas

This image shows a full page of primary-ruled paper. It features multiple sets of horizontal lines designed to guide handwriting. Each set consists of three lines: a solid top line, a dashed middle line, and a solid bottom line. These sets are repeated vertically down the entire page, providing ample space for practicing letter formation and alignment. The paper is otherwise blank, with no margins or additional markings.



Probióticos e pré-bióticos



150 g 18 €

30

2/1

Indicação

- Aumenta a flora benigna ao nível do papo e dos intestinos
- Assegura uma melhor digestão e promove a flora ao nível do papo e dos intestinos nas aves jovens
- Após tratamento com antibióticos

Administração 3 g/l de água de bebida ou 6 g/kg de ração

- Prevenção: durante 2 dias/semana
- Estrume líquido ou após tratamento com antibióticos: durante 5 a 7 dias
- Renovar diariamente
- Pode ser combinado com outros suplementos (vitaminas)



Mudar a água de bebida 2 vezes/dia ou administrar através da ração



Spray desinfetante



500 ml 15 €

NOVIDADE

Indicação

- Desinfetante de largo espectro
- Bactericida - Fungicida - Virucida

Administração

- Spray desinfetante pronto a usar
- Adequado para pombais, gaiolas, equipamento e ovos
- Indicado para a limpeza de coberturas de penas sujas (excrementos, sangue)



Seguro para aplicar junto às suas aves



Spray probiótico para infeções cutâneas



200 ml 17 €

32

Indicação

- Adequado para aves com pele sensível
- Para ser utilizado no cuidado externo da pele
- Reduz a descamação


Administração

- Pulverizar a zona a estabilizar



Fungos Favus e Flavus/flocos brancos

Pulverizar diariamente a crista ou a zona infetada.
Não é nocivo para os olhos e para as vias respiratórias.



ACIDIFICAÇÃO E DESINFECÇÃO DA ÁGUA DE BEBIDA



Acidificação da água de bebida



250 ml 15 €

34

Indicação

- Acidificação da água de bebida, redução do pH

Administração

- 1 a 2 ml/l de água de bebida
- Prevenção: 1 a 2 dias por semana



Fórmula com contornos excepcionais, muito económica de utilizar



Desinfecção da água de bebida



1 | 32 €

NOVIDADE

Indicação

- Desinfecção da água
- Prevenção de bactérias, vírus, leveduras e bolores nocivos
- Apoio à imunidade

Administração

- 2 ml/l de água de bebida



Maior duração e melhor ação devido à adição de prata



Elixir para o papo



36

Indicação

- Abordagem preventiva da tricomoníase
- Apoia a saúde da garganta e do papo
- Efeito benéfico no trato respiratório superior
- Desempenha um papel na defesa contra doenças

Administração

- No dia seguinte ao regresso a casa:
 - Administração recomendada: 10 ml/kg de ração
- **Preparar sempre fresco antes de cada administração de ração. Efeito ótimo até 2 horas após a mistura.**
 - 5 ml/l de água de bebida
 - 1 gota por narina
- Prevenção: durante 1 dia por semana
- A alta pressão: 2 dias por semana
- Cuidado: mancha a roupa e as mãos



Eficácia comprovada em casos de tricomoníase resistente: durante 5 dias, 20 ml/kg de ração



VITAMINAS, AMINOÁCIDOS, ELETRÓLITOS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS



Aminoácidos, eletrólitos e vitaminas



100 ml 19 €
250 ml 35 € 1 l
65 €

Vitamina E extra,
selênio e aminoácidos BCAA

38

Indicação

- Todos os aminoácidos essenciais para uma boa muda/ desenvolvimento das penas/formação de pigmentos
- Promove a recuperação/restabelecimento
- Desenvolvimento e recuperação muscular

Administração 2 ml/l de água de bebida

- Pombos-correio: 5 ml/l durante a época de voo
 - Durante todo o ano: 1 a 2 dias por semana
 - Durante toda a duração da muda: 3 dias/semana.
- Pode ser dado em conjunto com o *Condi-Plus*



Apoio adicional para pombos-correio em tempo quente 5 ml/l de água de bebida, em combinação com *Respisor* no dia do encestamento

Dextrose, glicérol, cloreto de sódio, fibras pré-bióticas, citrato de trimagnésio, sumo de beterraba, cloreto de potássio, sacarose, cloreto de cálcio, citrato tricálcico, lisina, metionina, treonina, triptofano, histidina, carnitina, betaína, colina, vitamina B1, vitamina B2, niacinamida, D-pantotenato de cálcio, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico, biotina, vitamina C, vitamina E, selênio, cobre, zinco, manganês, mistura de componentes aromáticos naturais, L-isoleucina, L-valina, L-leucina



Suplementos para a muda



250 ml 26 €

Indicação

- Promove a boa forma física durante a muda
- Apoia o metabolismo
- Fornecimento adicional de energia
- Estimulante de apetite

Administração 2 ml/l de água de bebida

- Durante toda a duração da muda: 3 dias/semana.
Pode ser combinado com *Aminovital*.



Pó nutritivo - Vitaminas, minerais e aminoácidos



40

Indicação

- Reforço nutritivo e energia extra
- Vitaminas, minerais e aminoácidos extra
- Aumenta a resistência
- Estimulação da reprodução

Administração

- Administração recomendada: 10 g/kg de ração
- Administração através da água de bebida: 4 g/l



- Geral: Durante todo o ano, 1 a 2 dias por semana. Em caso de mau estado/redução de nutrientes, durante 14 dias.
- Estimulação da reprodução: 2 a 4 semanas antes da reprodução, 2 dias/semanal a diariamente
- Pombos: Média distância/longa distância: 2 a 5 dias antes do encestamento

Dextrose, maltodextrina, concentrado de proteínas de soja, carbonato de cálcio, leveduras e suas partes, citrato de trimagnésio, fosfato monossódico, bicarbonato de sódio, cloreto de sódio, cloreto de potássio, fosfato trissódico, citrato tricálcico, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B11, vitamina B12, biotina, vitamina C, cloreto de colina, ferro, cobre, zinco, manganês, iodeto de potássio, selênio, lisina, metionina, triptofano, treonina, mistura de componentes aromáticos naturais



Fonte líquida de vitamina D, cálcio, fósforo e outros minerais



100 ml 20 €

250 ml 35 €

1 l 70 €

*Cálcio e
fósforo extra*

Indicação

- Para animais com deficiência de vitamina D3, cálcio, fósforo e outros minerais
- Apoia o desenvolvimento e a produção óssea em animais jovens
- Apoia a produção de casca de ovo
- Má qualidade da casca dos ovos/ovos podres

Administração 2 ml/l de água de bebida

- Prevenção: 2 ml/l
 - 2 semanas antes da reprodução até à postura dos ovos: 2 a 3 dias por semana
 - Durante as primeiras 6 semanas de vida: 2 a 3 dias por semana
- Tratamento: 5 ml/l durante 14 dias
- Suporte para fraturas: durante 6 semanas, 5 ml/l de água de bebida ou 0,5 ml/kg de peso corporal diretamente no bico



-Mudar a água de bebida 2 vezes/dia para evitar a sedimentação ou administrar através da ração (prevenção): 4 ml/kg de ração (ovo) - tratamento: 10 ml/kg de ração (ovo)

Fosfato trissódico, citrato de trimagnésio, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, citrato tricálcico, vitamina D3, colecalciferol, zinco, manganês, cobre, ferro



Multivitaminas solúveis em água



42

Indicação

- Suplemento com todas as vitaminas essenciais
- Saúde geral quotidiana
- Prevenção da deficiência crónica de vitamina A

Administração 2 ml/l de água de bebida

- Semanal: durante 1 a 2 dias por semana
- Após período de doença/recuperação: durante 3 a 5 dias consecutivos



Para papagaios e periquitos, recomendamos vivamente 1 a 2 dias por semana de *Vita-Plus* através da água de bebida para prevenir a deficiência de vitamina A



A elevada concentração de vitamina K ajuda a prevenir ou reparar hemorragias



PURO PURO

LEVEDURA DE CERVEJA



Indicação

- Aminoácidos, minerais e oligoelementos
- Vitamina B

Administração 15 a 30 g/kg de ração

1 kg 18 €

DEXTROSE



Indicação

- Fonte de energia extra
- Aromatização da água medicamentosa

Administração 15 a 30 g/l de água de bebida

1 kg 18 €

ELETRÓLITO



Indicação

- Hidratação em caso de desidratação
- Estabilização do equilíbrio hídrico e eletrolítico

Administração 15 a 30 g/l de água de bebida

500 g 18 €

44

AMARELO



Indicação

- Corante

Administração 1 a 2 g/kg de ração

100 g 15 €

500 g 60 €

PROTEÍNA ALTAMENTE DIGERÍVEL



Indicação

- Crescimento muscular
- Aminoácidos/proteínas adicionais

Administração 5 a 15 g/kg de ração

400 g 25 €

VERMELHO



Indicação

- Corante

Administração 1 g/kg ração

100 g 28 €


500 g 85 €



DIAGRAMAS PARA PÁSSAROS CANOROS

Calendário anual - Euro e Canários

Cronologia



Preparação da fase de reprodução

- Promoção da reprodução
- Alívio do fígado
- Prevenção da mancha negra

Resultado até ao desmame

- Início ideal e prevenção da doença do suor
- Supressão da coccidiose/atoxoplasmosse, bactérias, vírus, leveduras e fungos

Crias após desmame

- Prevenção da coccidiose/atoxoplasmosse, megabacteriose e disbacteriose
- Limite da pressão com o aumento da imunidade



Calendário anual - Euro e Canários



O calendário anual é um guia geral para a preparação, a reprodução, a incubação, o desmame e a muda. Discuta as necessidades específicas das suas aves com o seu veterinário e elaborem em conjunto um diagrama personalizado.

Preparação a partir de 6 a 8 semanas antes da reprodução

1. Tudo começa com um ambiente saudável! (ver Virkon™S ou SilverSpray)
2. Prevenção da atoxoplasmose/coccidiose + megabacteriose/disbacteriose
 - **Veterinário:** controlo das aves + exame do estrume 6 a 8 semanas antes da reprodução
 - Alguns tratamentos em caso de problemas:
 - 5 dias de Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 3 dias de Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 5 dias de Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
3. Durante 6 semanas antes da reprodução
 - **Diariamente: Immuno-Plus (2 ml/l)**
 - Promoção da reprodução; as aves atingem as condições ótimas (de reprodução)
 - 1 a 2 dias por semana **Hepa-Plus (4 ml/l)**
 - Alívio do fígado
 - Conforme necessário: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP
 - Todos eles podem ser combinados com Immuno-Plus
 - Extra: prevenção da mancha negra
 - Durante 7 dias **Gould Mix (5 g/l)** durante a preparação da fase de reprodução
4. Prevenção de ectoparasitas
 - Ácaros sugadores de sangue
 - **Exzolt:** 1 ml/l durante 1 dia, repetir nos dias 7 e 14
 - Sem impacto na fertilidade e crias (nidificantes)
 - Pode ser repetido a cada 3 meses
 - Prevenção adicional de ácaros sugadores de sangue
 - Antes da colocação em funcionamento do pombal/aviário, tratar com:
 - **Derma-Plus**
 - Ácaros das penas
 - **Vermi-Complete (1 ml/l água de banho)**

47

Reprodução: da eclosão ao desmame das aves jovens

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g ou 20 g/kg de ração (ovo))**
 - Pré-mistura completa para aves jovens
2. Primeiras 6 semanas
 - Opção 1: **Super Start-Up (5 g/kg de ração (ovo))**
 -  Supressão natural e prevenção da coccidiose/atoxoplasmose, bactérias, vírus, leveduras e fungos
 - Opção 2: **Super Start-Up Blue (20 g/kg de ração (ovo))**
 -  Supressão da coccidiose/atoxoplasmose, bactérias, vírus, leveduras e fungos



3. A partir de 2 dias antes da eclosão a 5 dias após a eclosão **Coli-Mix (5 g/l)**
- Prevenção da doença do suor (Colibacilose)
 - Alternativa ao Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**

Reprodução: aves jovens desmamadas

1. Tudo começa com um ambiente saudável!

- **Virkon™S ou SilverSpray**
 - Ambiente isento de coccidiose/atoxoplasmose, bactérias, vírus, leveduras e bolores
- **Neorni Stabilizer:** Spray ambiental probiótico
 - Prevenção através da redução da pressão bacteriana no ambiente

2. Prevenção

- 3ª semana após o desmame
 - **Aumento da suscetibilidade à atoxoplasmose/megabacteriose**
 - 5 dias de Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 3 dias de Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)
 - 5 dias de Sulfaclozine (3 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l) + Megadysbac (5 g/l)

3. Depois, durante todo o ano (desde o desmame até ao período de reprodução)

- **3 a 5 dias de ACS (0,5 ml/l) 1 a 2 vezes/mês**
 - Prevenção da coccidiose com reforço da imunidade!
- **1 a 2 dias por semana de Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prevenção da megabacteriose e disbacteriose

Período de muda

Durante o período completo da muda **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 dias/semana
- Aminovital (2 ml/l): 3 dias/semana
- Podem ser administrados em simultâneo

Meia estação


Durante todo o ano (desde o desmame até ao período da reprodução)

- **3 a 5 dias de ACS (0,5 ml/l) 1 a 2 vezes/mês**
 - Prevenção da coccidiose com reforço da imunidade!
- **1 a 2 dias por semana de Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prevenção da megabacteriose e disbacteriose
- Conforme necessário: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP

Na NeorniPharma, esforçamo-nos sempre por encontrar a melhor solução a longo prazo. Estamos continuamente a procurar **alternativas aos agentes antimicrobianos** para reduzir o risco de resistência. O objetivo consiste em tratar as nossas aves **o mínimo possível com tratamentos preventivos com antimicrobianos**. Para tal, o exame clínico e os eventuais testes adicionais são cruciais. Após um diagnóstico correto, pode ser instituído um tratamento adequado. **Os antibióticos não são inofensivos.** Consulte o seu veterinário para uma utilização correta e responsável. **Autópsia:** não deite fora uma ave morta! Esta pode fornecer muitas informações para chegar a um tratamento adequado. As aves devem ser conservadas em local fresco (frigorífico) e no prazo de 24 horas (máx. de 72 h).



Preparação da fase de reprodução



Desde 6 semanas antes da reprodução até à primeira postura



Precisa de aconselhamento?

O seu veterinário Neorni terá todo o prazer em ajudá-lo(a)

Immuno-Plus	Hepa-Plus
2 ml/l	4 ml/l
6 semanas antes do acasalamento até à primeira postura	6 semanas antes do acasalamento até à primeira postura
Diariamente	1 a 2 dias/semana
Estimulação da produção de espermatozoides e óocitos	Apoio ao fígado



49

Apoio adicional:

Vit E + Se	Vita-Min-DCP	Ready	Vita-Plus/Vita Energy
2 ml/l	2 ml/l	3-5 ml/l	2 ml/l ou 10 g/kg
2 a 4 semanas antes do acasalamento até à primeira postura	2 semanas antes do acasalamento até à primeira postura	6 semanas antes do acasalamento até à primeira postura	A: Ao longo do ano B: 2 semanas antes do acasalamento até à primeira postura
Diariamente	2 dias/semana	1 a 2 dias/semana	A: 1 a 2 dias/semana B: Diariamente
Dose extra elevada de Vit E+ Se, óleo de linhaça, arginina, espi-rulina, carnitina, zinco, etc.	Cálcio, fósforo, vitamina D3 e oligoelementos extra	Conversão da gordura em energia utilizável pela ave	Vitaminas extra

FERTILIZAÇÃO

CASCA DE OVO

NUTRIÇÃO

VITAMINAS

►►► Todos os produtos podem ser combinados entre si





Reprodução: da eclosão ao desmame



50

Coli-Mix



5 g/l ou 10 g/kg de ração (ovo)

2 dias antes a 5 dias após a eclosão

Sem impacto na fertilidade

Mistura de largo espectro

Prevenção da doença do suor e da doença das gaivotas

Immuno Booster NEW

20 g/kg de ração (ovo)

Diariamente desde a primeira postura até ao depósito das crias

Impacto positivo sobre a fertilidade

All-in premix

Manutenção de oócitos e produção de esperma

Super Start-Up



5 g/kg de ração (ovo)

Supressão e prevenção naturais coccidiose/atoxoplasmose, bactérias, vírus, leveduras e fungos

OU

Super Start-Up Blue

20 g/kg de ração (ovo)



Supressão da coccidiose/atoxoplasmose, bactérias, vírus, leveduras e fungos

O **Immuno Booster NEW** contém todos os componentes essenciais para a **criação de aves jovens**. Trata-se de uma pré-mistura **completa** única para aplicar na ração (ovos), fornecendo todos os nutrientes necessários em **concentrações exceccionalmente elevadas**.

Immuno Booster NEW: **Polipéptidos** Mantém as aves em forma durante a reprodução. **Saccharomyces cerevisiae** Fonte de proteínas, aminoácidos e nucleótidos. **Fibras de raiz de chicória** Fibra pré-biótica: digestão equilibrada. **Espirulina** Fonte de proteínas, gorduras, hidratos de carbono, vitaminas e minerais. **Eletrólitos** Equilíbrio ao nível dos líquidos. **Ácidos gordos** Energia, digestão equilibrada. **Todas as vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis** Imunidade geral, crescimento, libertação de energia. **Todas os aminoácidos** Desenvolvimento dos músculos e da plumagem. **L-carnitina** Apoia a digestão das gorduras e o desenvolvimento muscular. **Colina** Suporte hepático. **Minerais** (cobalto, ferro, cobre, zinco, manganês, iodo, selénio) Imunidade geral, antioxidantes, crescimento, libertação de energia. **Clinoptilolite** Saúde geral e intestinal. **Probióticos** Estabilizador da flora intestinal. **Curcuma e equináceas** Imunidade e saúde geral.



Reprodução: aves jovens desmamadas

COCCIDIOSE E ATOXO-PLASMOSE		MEGABACTÉRIAS E DIS-BACTERIOSE	
ACS		Dysbac Liquid	
0,5 ml/l		2 ml/l	
Do desmame ao período de reprodução seguinte		Do desmame ao período de reprodução seguinte	
3 a 5 dias/mês Se necessário: 2x/mês		1 a 2 dias/semana	
COCCIDIOSE E ATOXO-PLASMOSE		MEGABACTERIOSE, DISBACTERIOSE E FLAGELADOS	



Apoio suplementar ao longo de todo o ano

SUPORTE HEPÁTICO

Hepa-Plus
2 ml/l
O ano inteiro
1 a 2 dias/semana Em caso de adição de corante: 2 ml/l por dia
ALÍVIO DO FÍGADO



APOIO GERAL

Vita-Plus / Vita Energy
2 ml/l ou 10 g/kg
O ano inteiro
1 a 2 dias/semana
VITAMINAS EXTRA





Calendário anual Exóticos

O calendário anual é um guia geral para a preparação, a reprodução, a incubação, o desmame e a muda. Discuta as necessidades específicas das suas aves com o seu veterinário e elabore em conjunto um diagrama personalizado.

Preparação a partir de 6 a 8 semanas antes da reprodução

1. Tudo começa com um ambiente saudável! (ver Virkon™S ou SilverSpray)
2. Prevenção de flagelados (cochlosomosis) + campylobacter
 - **Veterinário:** controlo das aves + exame do estrume 6 a 8 semanas antes da reprodução
 - Alguns tratamentos em caso de problemas:
 - Durante 7 dias Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
3. Durante 6 semanas antes da reprodução
 - **Diariamente: Immuno-Plus (2 ml/l)**
 - Promoção da reprodução; as aves atingem as condições ótimas (de reprodução)
 - 1 a 2 dias por semana **Hepa-Plus (4 ml/l)**
 - Alívio do fígado
 - Conforme necessário: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP
 - Todos eles podem ser combinados com Immuno-Plus
 - Prevenção de cochlosomosis e campylobacter
 - Durante 7 dias **Gould Mix (5 g/l)** durante a preparação da fase de reprodução
4. Prevenção de ectoparasitas
 - Ácaros sugadores de sangue
 - **Exzolt:** 1 ml/l durante 1 dia, repetir nos dias 7 e 14
 - Sem impacto na fertilidade e crias (nidificantes)
 - Pode ser repetido a cada 3 meses
 - Prevenção adicional de ácaros sugadores de sangue
 - Um dia antes da entrada em funcionamento do pombal/aviário, tratar com:
 - **Derma-Plus**
 - Ácaros das vias respiratórias
 - **Vermi-Complete:** 2,5 a 5 ml/l durante 1 dia, repetir após 3 semanas
 - Ácaros das penas
 - **Vermi-Complete (1 ml/l água de banho)**

Reprodução: da eclosão ao desmame das aves jovens

1. **Immuno Booster NEW (2 g/100 g ou 20 g/kg de ração (ovo))**
 - Pré-mistura completa para aves jovens
2. Primeiras 6 semanas
 - Opção 1: **Super Start-Up (5 g/kg de ração (ovo))**
 -  Supressão natural e prevenção da coccidiose/atoxoplasmose, bactérias, vírus, leveduras e fungos
 - Opção 2: **Super Start-Up Blue (20 g/kg de ração (ovo))**
 -  Supressão da coccidiose/atoxoplasmose, bactérias, vírus, leveduras e fungos
3. A partir de 2 dias antes da eclosão a 5 dias após a eclosão **Coli-Mix (5 g/l)**
 - Prevenção da doença do suor (Colibacilose)
 - Alternativa ao Coli-Mix: **Gould Mix (5 g/l)**



4. Para problemas nas primeiras 6 a 8 semanas de vida

- **Gould Mix (5 g/l)**
 - Para o tratamento da cochlomosomose (doença das gaivotas), leveduras e diarreias bacterianas

Reprodução: aves jovens desmamadas

1. Tudo começa com um ambiente saudável!

- **Virkon™S ou SilverSpray**
 - Ambiente isento de coccidiose/atoxoplasmose, bactérias, vírus, leveduras e bolores
- **Neorni Stabilizer:** Spray ambiental probiótico
 - Prevenção através da redução da pressão bacteriana no ambiente

2. Prevenção

- 3ª semana após o desmame
 - **Aumento da suscetibilidade à coccidiose/cochlomosomose/campylobacter**
 - 5 dias de Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)
 - 3 dias de Hepa-Plus (4 ml/l)
 - 5 dias de Gould Mix (5 g/l) + Hepa-Plus (4 ml/l)

3. Depois, durante todo o ano (desde o desmame até ao período de reprodução)

- **3 a 5 dias de ACS (0,5 ml/l) 1 a 2 vezes/mês**
 - Prevenção da coccidiose com reforço da imunidade!
- **1 a 2 dias por semana de Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prevenção da megabacteriose e disbacteriose
 - Prevenção de flagelados (cochlomosomose)

Período de muda

Durante o período completo da muda **Condi-Plus + Aminovital:**

- Condi-Plus (2 ml/l): 3 dias/semana
- Aminovital (2 ml/l): 3 dias/semana
- Podem ser administrados em simultâneo

Meia estação

Durante todo o ano (desde o desmame até ao período da reprodução)

- **3 a 5 dias de ACS (0,5 ml/l) 1 a 2 vezes/mês**
 - Prevenção da coccidiose com reforço da imunidade!
- **1 a 2 dias por semana de Dysbac Liquid (2 ml/l)**
 - Prevenção da megabacteriose e disbacteriose
 - Prevenção de flagelados (cochlomosomose)
- Conforme necessário: Vita-Plus, Vita Energy, Ready, Vit E + Se, Vita-Min-DCP

53

Na NeorniPharma, esforçamo-nos sempre por encontrar a melhor solução a longo prazo. Estamos continuamente a procurar **alternativas aos agentes antimicrobianos** para reduzir o risco de resistência. O objetivo consiste em tratar as nossas aves **o mínimo possível com tratamentos preventivos com antimicrobianos**. Para tal, o exame clínico e os eventuais testes adicionais são cruciais. Após um diagnóstico correto, pode ser instituído um tratamento adequado. **Os antibióticos não são inofensivos.** Consulte o seu veterinário para uma utilização correta e responsável. **Autópsia:** não deite fora uma ave morta! Esta pode fornecer muitas informações para chegar a um tratamento adequado. As aves devem ser conservadas em local fresco (frigorífico) e devem ser observadas no prazo de 24 horas (máx. de 72 h).



Calendário de vacinação de pombos

INTERVALO DE 3 A 4 SEMANAS

Cria

6 semanas de idade	Rota-paramyxo
8 semanas de idade	Salmonela/herpes paratifoide
10 semanas de idade	Varíola (método injetável/folicular)
3 a 4 semanas antes do treino	Rota-paramyxo BOOSTER (REFORÇO)
Meados de junho - início de julho*	Paramyxo-herpes REFORÇO (HERPES)



Precisa de aconselhamento?

O seu veterinário Neorni terá todo o prazer em ajudá-lo(a)

TEMPO A sequência e a repetição das vacinas são parcialmente determinadas pela pressão da infeção no seu pombo. Contacte a NeorniVet para obter orientação sobre este assunto.

DOENÇA DOS POMBOS JUVENIS A vacinação dupla com 3 a 4 semanas de intervalo contra o **rotavírus** confere a melhor proteção contra a doença dos pombos jovens ("adeno" na linguagem popular). Em caso de forte pressão infecciosa, um **3º reforço** administrado 3 semanas antes da criação. A vacinação contra o adenovírus e o circovírus não é recomendada devido à sua eficácia não comprovada e à inexistência de estirpes de pombos.

APOIO Apoie as suas aves jovens durante o período de vacinação nas primeiras 6 semanas após o desmame com **Immuno-Plus**, **Dysbac Liquid** e **Trichoryza Drops**.



Pombos velhos e borrachos

54

Meados de fevereiro	Varíola (método injetável/folicular) MAIS-VALIA PARA OS POMBOS BORRACHOS
Fim de fevereiro	Paramyxo-herpes
14 dias depois	Salmonela/febre paratifoide**

APOIO Guie os seus pombos velhos e borrachos de forma ótima para o início da nova época com **Trichoryza Drops**, **Dysbac Liquid** e **Ready**.



Pombos de criação

6 a 7 semanas antes do acasalamento	Salmonela/febre paratifoide**
Meados de outubro	Paramyxo-herpes

SALMONELA/FEBRE PARATOFÓIDE Dependendo da pressão da infeção e da imunidade, pode ou não ser necessário tratar os pombos antes da vacinação e vacinar uma ou duas vezes.

HERPES Em caso de problemas de herpes durante a criação de pombos jovens, recomenda-se que as pombas reprodutoras sejam vacinadas duas vezes contra o herpes.

PARAMIXOVIROSE A vacinação anual contra a paramixovirose é obrigatória para os pombos reprodutores.

APOIO Incentivar os pombos reprodutores 2 semanas antes do acasalamento até à 1ª postura com **Vita-Min-DCP** e **Immuno-Plus**. Maus fertilizantes/pombos-machos velhos: suplemento com **Vit E + Se**.



* 3 a 4 semanas antes do período crítico

** Possivelmente após tratamento preventivo em caso de infeção anterior





DIAGRAMAS PARA POMBOS



Reprodução



2 semanas antes da reprodução até à postura

Trichoryza Drops	Vita-Min-DCP	Immuno-Plus
10 ml/kg de ração	2 ml/l	2 ml/l
Durante a reprodução	2 semanas antes do acasalamento até à primeira postura	2 semanas antes do acasalamento até à primeira postura
Após período de doença/recuperação: durante 3 dias consecutivos	2 dias/semana	Diariamente
Eficácia comprovada contra a tricomoníase resistente	Cálcio, fósforo, vitamina D3 e oligoelementos extra	Estimulação da produção de espermatozoides e oócitos

Durante o período de reprodução

56

Tricho Geel
3 g/l ou 6 g/kg de ração
Durante a reprodução
Durante 5 dias consecutivos
Reduz a pressão da tricomoníase + evita a hexamitiase nas crias



Precisa de aconselhamento?

O seu veterinário Neorni terá todo o prazer em ajudá-lo(a)

Da eclosão ao desmame

Immuno Booster NEW + Feather Energy	Trichoryza Drops	Aminovital
20 g/kg de ração + 5 ml/kg de ração	10 ml/kg de ração	2-5 ml/l
Da eclosão das crias até ao desmame	Reprodução completa	Da eclosão das crias até ao desmame
2 a 3 dias/semana	Durante 1 dia a cada 2 semanas	3 dias/semana
All-in premix	Eficácia comprovada contra a tricomoníase resistente	Aminoácidos e vitaminas adicionais para um rápido crescimento



Preparação do período de voo

POMBOS VELHOS E BORRACHOS



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready



10 ml/kg



1 dia/2 semanas



Eficácia comprovada contra a tricomoniase resistente

Saúde ao nível do papo, glândulas intestinais e intestinos, estrume sólido

Uso diário 2 semanas antes do início da época de voo

Reforço da forma e da imunidade



Formação insuficiente: durante 14 dias Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)

POMBOS JOVENS "JUNIOR"

57



Immuno Booster NEW



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



20 g/kg



2 a 3 dias/semana durante 6 a 8 semanas, depois 1 dia/semana durante toda a época de voo



Crescimento e energia, previne as carências nutricionais

Eficácia comprovada contra a tricomoniase resistente

Saúde ao nível do papo, glândulas intestinais e intestinos, estrume sólido



Formação insuficiente: durante 14 dias Immuno-Plus (2 ml/l) + Ready (2 ml/l)



Precisa de aconselhamento?

O seu veterinário Neorni terá todo o prazer em ajudá-lo(a)

>>>> Este diagrama dá uma indicação de como os produtos NeorniPharma podem ser utilizados em determinadas circunstâncias. O nosso objetivo consiste em formar um regime adequado e completo com o menor número possível de produtos. Todos estes suplementos podem ser combinados, se necessário. Em caso de mau desempenho, procuramos em conjunto a causa e devem ser efetuados os ajustamentos ou tratamentos adequados. Precaução: os suplementos alimentares devem ser preparados no dia anterior para que possam ser bem absorvidos e os pombos absorvam melhor os alimentos.





Época de voo

BAIXA VELOCIDADE



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



10 ml/kg

2 ml/l



Dia seguinte ao regresso a casa

Início da semana



Durante 1 dia

Durante 2 dias



Eficácia comprovada contra a tricomoníase resistente

Saúde ao nível do papo, glândulas intestinais e intestinos, estrume sólido



Apertar a narina, pingar e deixar a gota espalhar-se

Pode ser administrado diariamente

58

ALTA VELOCIDADE - MÉDIA DISTÂNCIA



Aminovital



Trichoryza Drops



Dysbac Liquid



Ready



5 ml/l

10 ml/kg

2 ml/l

5 ml/l



Regresso a casa

Dia seguinte ao regresso a casa

Início da semana

Antes do encestamento



Durante 1 dia
Voos intensos: durante 2 a 3 dias

Durante 1 a 2 dias

Durante 2 dias

Alta velocidade: 1 dia -
Meia distância: 2 a 3 dias



Recuperação rápida

Eficácia comprovada contra a tricomoníase resistente

Saúde ao nível do papo, glândulas intestinais e intestinos, estrume sólido

Forma



Em tempo quente: dia de encestamento

Apertar a narina, pingar e deixar a gota espalhar-se

Pode ser administrado diariamente

Para um voo importante: diariamente 10 dias, juntamente com o Immuno-Plus



LONGA DISTÂNCIA

Recuperação



Immuno Recup Caps

1 cápsula/pombo

Durante 1 a 2 dias

Recuperação rápida



Aminovital

5 ml/l

Durante 2 a 3 dias

Recuperação rápida



Immuno Booster NEW

20 g/kg

Durante 2 dias

Recuperação rápida, repondo as carências nutricionais

Manutenção



Trichoryza Drops

10 ml/kg

Durante 2 dias

Eficácia comprovada contra a tricomoniase resistente



Dysbac Liquid

2 ml/l

Durante 2 dias

Saúde ao nível do papo, glândulas intestinais e intestinos, estrume sólido



Respikor

3 ml/l

Durante 2 dias

Vias respiratórias, bico branco

59

Reforço antes do encestamento



Feather Energy

5 ml/kg

Durante 2 a 5 dias

Energia rica em gordura



Vita Energy

10 g/kg de ração

Durante 2 a 5 dias

Estimula a boa forma física



Immuno-Plus

2 ml/l

Durante 2 a 5 dias

Energia extra



Red Race

5 g/2 l

Durante 2 a 5 dias

Absorção adicional de nutrientes



Muda Apoio



Aminovital

2 ml/l

3 dias/semana

**AMINOÁCIDOS +
VITAMINAS**



Immuno Booster NEW

20 g/kg

2 dias/semana

ALL-IN PREMIX



Feather Energy

5 ml/kg

2 dias/semana

ÁCIDOS GORDOS



Combate ectoparasitas

V-Exmite Drops

1 a 2 gotas no pescoço

Período de muda

**TRATAMENTO
INDIVIDUAL**



Vermi-Complete

1 ml/l água do banho

Período de muda

TRATAMENTO DE GRUPO



60

Preparação da fase de reprodução

Quando a época dos pombos termina no final de setembro, início de outubro, recomendamos vivamente que **durante 5 dias recolha o chorume dos pombos reprodutores e mande examiná-lo**. Este chorume é controlado para detetar vermes, coccidiose, leveduras/fungos e depois colocado em cultura para controlo da paratifoide/salmonela. Com base nos resultados, pode ser elaborado um plano de vacinação.

	Teste de paratifoide/salmonela NEGATIVO	Teste de paratifoide/salmonela POSITIVO
Tratamento	Não é necessário	Necessário durante 10 dias de acordo com o antibiograma
Vacinação	Fortemente recomendado	É necessário
Calendário de vacinação	6 a 8 semanas antes do acasalamento	2 dias após o tratamento



Discuta um plano de ação adaptado ao seu pombal/galinheiro e/ou qualquer problema com a nossa clínica veterinária Neornivet (+32 (0)11 96 91 02)

Teste ao estreme

- Recolha o estreme diariamente durante 5 dias e armazene-o no frigorífico
- Envie o estreme ou leve uma amostra ao seu veterinário
- Se desejar, os pombos podem ser controlados ao mesmo tempo
- Não fará mal se os pombos ainda estiverem no processo de muda



Precisa de aconselhamento?

O seu veterinário Neornivet terá todo o prazer em ajudá-lo(a)





DIAGRAMAS PARA PAPAGAIOS



Papagaios

PAPAGAIOS E PERIQUITOS

Saúde geral



Prevenção de
deficiências
crônicas

O ano inteiro
1 a 2 dias/semana
Vita-Plus ou Vita-Energy

Reprodução

62

PREVENÇÃO

6 a 8 semanas
antes do
período de
reprodução

Controlo do chorume de 3 a 5 dias (veterinário)

- Se necessário, desparasitar com **Vermi-Completo**
 - Grupo: 5 ml/l de água de bebida
 - Individual: 1 ml/kg de peso corporal no bico

Controlo de ectoparasitas

- Grupo: **Vermi-Completo** 1 ml/l de água de banho
- Individual:
 - < 250 g: **Endo-Ecto Kanarie**
 - > 250 g: **V-Exmite Drops**

ESTIMULAÇÃO

diariamente 4
a 6 semanas
antes da fase
de reprodução

Vita Energy + Immuno-Plus

Em conjunto na água de bebida
e/ou na ração



CRIAÇÃO

diariamente,
da eclosão à
autonomia

Ninhada natural:

- **Immuno Booster NOVIDADE** 2 g/100 g de ração (ovo) + **Immuno-Plus** 0,2 ml/100 ml na água de bebida

Criação à mão:

- **Immuno Booster NEW** 2 g/100 g papa 1 vez/dia + **Immuno-Plus** 1 ml/kg de peso corporal 1 vez/dia



Problemas no papo e sistema digestivo



Durante 7 a 14 dias
1 ml/kg peso corporal
Hepa-Plus



Durante 7 dias
1 cápsula/kg de peso corporal
SBS Caps



Precisa de aconselhamento?

O seu veterinário Neorni
terá todo o prazer em
ajudá-lo(a)

63

Controlo (veterinário):

- Testes de doenças por meio de recolha de sangue - penas - esfregaço cloacal
- Esfregaço do papo

Muda - Penas



**Apoio adicional
ao crescimento
na primavera**

Muda + perda de penas
3 dias/semana
Aminovital + Condi-Plus
(2 ml/l) (2 ml/l)

SilverSpray

Novo spray desinfetante

Amigo
das aves
De largo espectro
Pronto a usar
Amplamente
implementável





DIAGRAMAS PARA GALINHAS

Diagrama de vacinação



Pintos

Apoio

Conforme necessário:

- Primeiros 14 dias de vida **Immuno Booster NEW** (20 g/kg de ração)
- Vitaminas gerais: 3 dias/semana **Vita-Plus** (2 ml/l)
- Saúde intestinal + pré-bióticos: 2 dias/semana **Dysbac Liquid** (2 ml/l)
- Crescimento extra + aminoácidos: 2 dias/semana **Aminovital** (2 ml/l) + **Immuno-Plus** (2 ml/l)

Vacinas

DIRETIVA GERAL: 3 vacinas (Marek, NCD e varíola)

D1 (1ª semana de vida)	Marek (2 estirpes) + IBD + NCD (injeção)
D1 (1ª semana de vida)	Bronquite infecciosa (colírio)
1ª semana de vida	Coccidiose (água de bebida)



Precisa de aconselhamento?

O seu veterinário Neorni terá todo o prazer em ajudá-lo(a)

Galinhas em crescimento (a partir de 7 semanas) e galinhas adultas

66

Apoio

- Vitaminas gerais: **Vita-Plus** (2 ml/l). Prevenção: 2 dias/semana. Após o tratamento: durante 7 dias.
- Saúde intestinal + pré-bióticos: **Dysbac Liquid** (2 ml/l). Prevenção: 2 dias/semana. Em caso de estrume mais líquido: durante 7 dias.
- Suporte de vias respiratórias: **Respikor** (3 ml/l). Prevenção: 2 dias/semana. Para problemas respiratórios: durante 7 a 14 dias.

Vacinas

Maio-junho (anual!)	Varíola (+ ILT)
Maio-junho (anual!)	NCD (injeção/água de bebida)
Agosto-setembro	NCD (óleo de injeção) Obrigatório em caso de exposição e venda
Agosto-setembro	Bronquite infecciosa (água de bebida)

Conselhos para todas as idades

- **DIRETIVA GERAL:** 3 vacinas (Marek, NCD e varíola). As outras vacinas são uma extensão a áreas problemáticas específicas e não são recomendadas em termos de rotina.





Conselhos e dicas

Saúde geral



O ano inteiro
1 dia/semana
Vita-Plus (2 ml/l)

Durante a muda
3 dias/semana
Aminovital e Condi-Plus (2 ml/l)

Cascas de ovos fracas

Tratamento

Vita-Min-DCP durante 21 dias

- Grupo: 5 ml/l ou 10 ml/kg de ração
- Individualmente pela bico: 1 ml/kg LG

Desparasitação dia 1, dia 7 e dia 21

- Grupo: **Vermi-Complete** 5 ml/l
- Individualmente pela bico: **Endo-Ecto Plus Caps:** 1 cápsula/kg LG ou **Vermi-Complete** 1 ml/kg LG

Prevenção

Verificar o chorume cada 3 a 4 meses:

- Não se esqueça de mandar examinar também o chorume de 2 a 3 dias para detetar endoparasitas - estes podem ser responsáveis por deficiências e, por conseguinte, por divergências

Vacinação RT+IBmulti+ND+EDS

- Infecções virais e malformações próximo do oviduto



67

Muco



Infecção ligeira + animal novo
7 a 14 dias
Respisor (3 ml/l)

Pescoço torcido/elevado



Pescoço torcido
14 a 21 dias
Vit E + Se

Grupo:
2 ml/l
Individual (bico):
0,2-0,5 ml/kg LG

Exposição ou exibição



Forma geral
7 dias antes da exibição
Immuno-Plus (2 ml/l)

Patas mais amarelas
14-21 dias antes da exibição
Amarelo PURO 1-2 g/kg

Se os problemas persistirem, é melhor marcar uma consulta com o seu veterinário

Preços para exportação

Apresentamos de seguida os nossos preços para exportação para particulares e profissionais. Estes preços **não incluem IVA**. Aquando do envio, são aplicadas as taxas de IVA do país de destino. Os profissionais, como sempre, estão isentos de IVA.

PRODUTO	Preço (€) sem IVA incl.	PRODUTO	Preço (€) sem IVA incl.
Immuno Booster NEW (1 kg)	53,72	Trichoryza Drops (50 ml)	14,05
Immuno-Plus (100 ml)	20,66	Trichoryza Drops (250 ml)	48,76
Immuno-Plus (250 ml)	45,45	Trichoryza Drops (1 l)	136,36
Immuno-Plus (1 l)	147,93	Aminovital (100 ml)	15,70
Immuno Recup Caps (80 c)	19,83	Aminovital (250 ml)	28,93
Super Start-Up (200 g)	20,66	Aminovital (1 l)	53,72
Vit E + Se (100 ml)	14,05	Condi-Plus (250 ml)	21,49
Vit E + Se (250 ml)	28,93	Vita Energy (400 g)	24,79
Hepa-Plus (100 ml)	16,53	Vita-Min-DCP (100 ml)	16,53
Hepa-Plus (250 ml)	29,75	Vita-Min-DCP (250 ml)	28,93
Hepa-Plus (1 l)	65,29	Vita-Min-DCP (1 l)	57,85
Ready (100 ml)	18,18	Vita-Plus (100 ml)	14,88
Ready (250 ml)	39,67	Vita-Plus (250 ml)	23,14
Dysbac Liquid (250 ml)	30,58	Vita-Plus (1 l)	53,72
Feather Energy (400 ml)	15,70		
PikStop (100 ml)	23,14	PURO	
Respikor (100 ml)	15,70	Levedura de cerveja (1 kg)	14,88
Respikor (250 ml)	28,93	Dextrose (1 kg)	14,88
Neorni Stabilizer (1 l)	16,53	Eletrólito (500 g)	14,88
Probi-Plus (150 g)	14,88	Amarelo (100 g)	12,40
SilverSpray (500 ml)	12,40	Amarelo (500 g)	49,59
Skin Spray (200 ml)	14,05	Proteína de elevada digestibilidade (400 g)	20,66
CU-For Liquid (250 ml)	12,40	Vermelho (100 g)	23,14
SilverFlox (1 l)	26,45	Vermelho (500 g)	70,25

Índice

Amarelo	44
Aminovital	38
Condi-Plus	39
CU-For Liquid	34
Dextrose	44
Diagrama de vacinação para pombos	54
Diagramas para aves canoras	46-53
Diagramas para galinhas	66-67
Diagramas para papagaios	62-63
Diagramas para pombos	56-60
Disbacteriose	18
Dysbac Liquid	19
Eletrolito	44
Feather Energy	22
Hepa-Plus	14
Immuno Booster NEW	7
Immuno-Plus	8
Immuno Recup Caps	9
Levedura de cerveja	44
Neorni Stabilizer	28
PikStop	24
Probi-Plus	30
Promoção da cultura natural	6
Proteína altamente digerível	44
Ready	15
Respikor	25
SilverFlox	35
SilverSpray	31
Skin Spray	32
Super Start-Up	10
Terapia de fertilidade	12
Trichoryza Drops	36
Vermelho	44
Vita Energy	40
Vita-Min-DCP	41
Vita-Plus	42
Vit E + Se	11

PT

T +32 (0)11 96 91 02
E info@neornipharma.be
W www.neornipharma.be

Receção e armazém:
Beverlosesteenweg 129
3583 Paal, Bélgica

