



VACCINATIESCHEMA 2021



Tel: +32 (0) 13 35 37 01
E-mail: vogels@galluvet.be

Algemene vaccins

- **PARAMYXO**
 - Alle vliegduiven dienen gevaccineerd te worden. Deze vaccinatie is 1 jaar geldig.
 - Kwekers: jaarlijks 1x
 - best vaccineren in oktober-november (op deze manier zijn de jongen beschermt via passieve immuniteit)
 - Jaar- en oude duiven: Jaarlijks 1x
 - In oktober samen met de kwekers of in januari voor het vliegseizoen
 - Jongen: vanaf het spenen (4w) 2x
- **POKKEN**
 - Borstelmethode of via injectie
- **HERPES**
 - Vermindert de symptomen van herpes virus infecties
 - Vnl. de **kweekduiven (duivinnen) in het najaar** (bescherming naar de jonge duiven toe d.m.v. passieve immuniteit)
- **PARATYFUS OF SALMONELLA VACCIN**
 - Preventieve vaccinatie kwekers, oude duiven, jaarduiven en jongen

Vaccins tegen “de jonge duivenziekte”?

Als oorzaak duiden we volgende virussen aan: **Rota, Circo en Adeno** virus. Deze verzwakken de duiven en zorgen voor een **daling van de immuniteit** bij de duiven waardoor andere bacteriën hun kans zien om explosief te vermeerderen en grote problemen te veroorzaken zoals bijvoorbeeld een *E. coli* septicemie. In de volksmond wordt “de jonge duivenziekte” ook wel verkeerdelijk “adeno” genoemd. Uit recent onderzoek is gebleken dat de **grootste onderliggende oorzaak** niet het adenovirus maar het **rotavirus** is, dat in de laatste jaren steeds sterker is geworden. Uit de vele onderzoeken in onze praktijk kunnen we dit ook bevestigen: steeds weer komt het rotavirus naar boven als primaire oorzaak van het probleem. Sinds kort is er een vaccin beschikbaar, waarvan de werking wetenschappelijk werd onderzocht. Deze dient **2x gevaccineerd** te worden bij de jonge duiven om zo de problemen van “de jonge duivenziekte” drastisch te verminderen.

- **ROTAVIRUS**
 - Preventieve vaccinatie jonge duiven **tegen de jonge duivenziekte**
- **(ADENOVIRUS)**
 - Momenteel wordt er geen specifieke duivenstam gebruikt in de beschikbare vaccins, waarbij de immuniteit naar duiven toe niet bewezen is.
- **(CIRCOVIRUS)**
 - Er zijn geen officiële vaccins voor duiven op de markt. Degene die op internet beschikbaar zijn, zijn niet officieel en gebruiken geen specifieke duivenstam waarbij de immuniteit naar duiven toe niet bewezen is.



NEORNI PHARMA

Dwarsstraat 3, 3560 Lummen (BE), +32 (0)13 35 89 82, info@neornipharma.be





Schema's

Voor een booster of hervaccinatie met hetzelfde vaccin raden we aan om minstens 2-3 weken tussen de twee vaccinaties te laten. Tussen 2 verschillende vaccinaties kan de periode worden ingekort tot 1 à 2 weken.

- **KWEKERS** (najaar: sept-okt)

Wij adviseren om in het najaar, na het vliegseizoen, de **mest van de kwekers** gedurende 5 opeenvolgende dagen te verzamelen en in de frigo te bewaren. De mest onderzoeken we op wormen, coccidiose, gisten en paratyfus om zo een gepast advies te geven naar vaccinatie en behandeling toe.

- Autovaccin Galluvet **Salmonella/Paratyfus + Herpes**
- 10d later: **Paramyxo**
- 10d later: autovaccin Galluvet **Salmonella/Paratyfus + Herpes**

Ten vroegste 2-3 weken na de laatste salmonella/paratyfus vaccinatie mag er gekoppeld worden om de opbouw van voldoende antistoffen toe te laten.

- **JAAR- EN OUDE Vliegduiven** (voorjaar: januari)

Als deze reeds in het najaar met de kwekers mee gevaccineerd werden, moeten deze vaccinaties niet meer gebeuren. Desondanks is het wel aangeraden om de immuniteit van de duiven een boost te geven voor het seizoen begint.

- Autovaccin Galluvet **Salmonella/Paratyfus***
- 10d later: **Paramyxo**
- 10d later: autovaccin Galluvet **Salmonella/Paratyfus***
- (Ten laatste 3 weken voor het seizoen: **Pokken**)

- **JONGEN**

- Bij spenen: autovaccin Galluvet **Salmonella/Paratyfus + Rotavirus***
- 10d later: **Paramyxo**
- 10d later: autovaccin Galluvet **Salmonella/Paratyfus + Rotavirus***
- 10d later: **Paramyxo**
- Ten laatste 3 weken voor het seizoen: **Pokken**

*Opgelet:

- Entreacties of granuloomvorming kunnen steeds voorkomen bij olievaccins. Deze worden door de duif zelf afgestoten. Bij de tweede injectie 2-3 weken na de eerste, wordt er best aan de andere kant van de nek gevaccineerd als bij de eerste vaccinatie om het aantal entreacties te beperken.
- Plattere mest na vaccinatie kan zich voordoen. In dit geval worden de duiven best ondersteund met Dysbac Liquid (water) en Immuno-Booster (voer).
- Bij **Salmonella/Paratyfus vaccinatie** kan **preventief Dysbac Liquid** gegeven worden ged. **5d voor** de vaccinatie **tot 5d na** de vaccinatie